

水稲(6月下旬~7月上旬)

単位: %

|          | 葉いもち  | 紋枯病 | 縞葉枯病 | 心枯れ茎 | イネドロオウムシ | イネツトムシ | 備考   |
|----------|-------|-----|------|------|----------|--------|--|
| 県全体発生ほ場率 | 21.8  | 0.0 | 16.7 | 3.8  | 28.2     | 15.4   | 令和4年6月下旬~7月上旬                                      |
| 平年値      | 5.9   | 1.7 | 27.7 | 8.2  | 24.1     | 14.6   | 総調査ほ場数: 78   |
| 平年比      | 369.6 | 0.0 | 60.2 | 46.9 | 117.0    | 105.3  |  |
| 発生程度     | 多     | 少   | 平年並  | やや少  | 平年並      | 平年並    | ※平年比=(発生ほ場率/平年値)×100                               |
| 県全体発生株率  | 0.1   | 0.0 | 0.1  | 0.0  | 0.5      | 0.06   | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| 平年値      | 0.1   | 0.0 | 0.5  | 0.1  | 0.5      | 0.1    |  |
| 平年比      | 171.8 | 0.0 | 9.7  | 34.3 | 95.4     | 112.2  |  |
| 発生程度     | やや多   | 少   | 少    | やや少  | 平年並      | 平年並    |  |
| 県北部発生株率  | 0.10  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.13     | 0.0    | 総調査ほ場数: 30   |
| 平年値      | 0.01  | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.3      | 0.02   |  |
| 平年比      | 750.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 45.3     | 0.0    |  |
| 発生程度     | 多     | 少   | 少    | 少    | やや少      | 少      |  |
| 県中部発生株率  | 0.1   | 0.0 | 0.0  | 0.1  | 1.2      | 0.1    | 総調査ほ場数: 28   |
| 平年値      | 0.1   | 0.0 | 0.5  | 0.2  | 1.0      | 0.1    |  |
| 平年比      | 64.5  | 0.0 | 10.3 | 40.7 | 117.0    | 169.5  |  |
| 発生程度     | 平年並   | 少   | 少    | やや少  | 平年並      | やや多    |  |
| 県南部発生株率  | 0.2   | 0.0 | 0.1  | 0.0  | 0.0      | 0.07   | 総調査ほ場数: 20   |
| 平年値      | 0.07  | 0.1 | 1.4  | 0.0  | 0.0      | 0.1    |  |
| 平年比      | 285.7 | 0.0 | 9.4  | 0.0  | 1000.0   | 133.3  |  |
| 発生程度     | 多     | 少   | 少    | 少    | 多        | 平年並    |  |
| 概 評      | 多     | 少   | やや少  | やや少  | 平年並      | 平年並    |  |

葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病、心枯れ茎、イネドロオウムシ・イネツトムシは300株調査

水稲(7月中旬)

単位: %

|          | 葉いもち  | 紋枯病   | 縞葉枯病 | 心枯れ茎  | イネツトムシ | 備考   |
|----------|-------|-------|------|-------|--------|--|
| 県全体発生ほ場率 | 35.9  | 15.4  | 24.4 | 16.7  | 5.1    | 令和4年7月11~13日調査                                     |
| 平年値      | 24.6  | 11.0  | 42.1 | 10.8  | 8.5    | 総調査ほ場数: 78   |
| 平年比      | 145.8 | 139.5 | 57.9 | 154.8 | 60.6   | ※平年比=(発生ほ場率/平年値)×100                               |
| 発生程度     | やや多   | 平年並   | やや少  | やや多   | 平年並    | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| 県全体発生株率  | 2.7   | 0.7   | 0.2  | 0.3   | 0.0    |  |
| 平年値      | 1.0   | 0.6   | 1.1  | 0.1   | 0.0    |  |
| 平年比      | 264.7 | 120.7 | 18.7 | 250.0 | 0.0    |  |
| 発生程度     | 多     | 平年並   | 少    | 多     | 少      |  |
| 県北部発生株率  | 1.0   | 0.0   | 0.0  | 0.1   | 0.0    | 総調査ほ場数: 30   |
| 平年値      | 0.6   | 0.3   | 0.1  | 0.1   | 0.0    |  |
| 平年比      | 161.3 | 0.0   | 0.0  | 125.0 | 0.0    |  |
| 発生程度     | やや多   | 少     | 少    | 平年並   | 少      |  |
| 県中部発生株率  | 0.5   | 0.3   | 0.0  | 0.7   | 0.0    | 総調査ほ場数: 28   |
| 平年値      | 1.2   | 0.4   | 1.0  | 0.3   | 0.0    |  |
| 平年比      | 42.0  | 81.1  | 0.0  | 280.0 | 0.0    |  |
| 発生程度     | やや少   | 平年並   | 少    | 多     | 少      |  |
| 県南部発生株率  | 8.3   | 2.2   | 0.6  | 0.0   | 0.0    | 総調査ほ場数: 20   |
| 平年値      | 1.4   | 1.4   | 2.6  | 0.0   | 0.0    |  |
| 平年比      | 576.4 | 160.6 | 23.1 | 0.0   | 0.0    |  |
| 発生程度     | 多     | やや多   | やや少  | 少     | 少      |  |
| 概 評      | やや多   | 平年並   | やや少  | やや多   | やや少    |  |

\* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・心枯れ茎・イネツトムシは300株調査

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(6月下旬)

|           | クモヘリカメムシ                |     |       | ホソハリカメムシ |       |       | カスミカメ類                       |                  |             | 斑点米カメムシ類合計 |            |
|-----------|-------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|           | 幼虫                      | 成虫  | 成幼虫   | 幼虫       | 成虫    | 成幼虫   | アカヒゲホソミドリカスミカメ幼虫・アカスジカスミカメ幼虫 | アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫 | アカスジカスミカメ成虫 |            |            |
| 発生地点数(か所) | 0                       | 2   | 2     | 5        | 28    | 28    | 22                           | 37               | 25          | 40         | 総調査地点数: 40 |
| 発生地点率     | 本年 [A] (%)              | 0.0 | 5.0   | 5.0      | 12.5  | 70.0  | 70.0                         | 55.0             | 92.5        | 62.5       | 100.0      |
|           | 平年 [B] (%)              | 0.0 | 3.9   | 3.6      | 7.5   | 34.2  | 37.2                         | 63.7             | 89.9        | 75.0       | 99.2       |
|           | 平年比 (%) (([A]/[B])×100) | -   | 129.2 | 138.4    | 167.5 | 205.0 | 188.3                        | 86.3             | 102.9       | 83.3       | 100.9      |
| 発生程度      | 少                       | 並   | 並     | やや多      | 多     | 多     | 並                            | 並                | 並           | 並          |            |
| 頭数        | すくい取り頭数合計(頭)            | 0   | 2     | 2        | 24    | 69    | 93                           | 625              | 538         | 105        | 1609       |
|           | 本年平均 [C] (頭)            | 0.0 | 0.1   | 0.1      | 0.6   | 1.7   | 2.3                          | 15.6             | 13.5        | 2.6        | 40.2       |
|           | 平年 [D] (頭)              | 0.0 | 0.1   | 0.1      | 0.1   | 0.8   | 0.9                          | 33.2             | 19.9        | 14.4       | 73.7       |
|           | 平年比 (%) (([C]/[D])×100) | -   | 79.8  | 83.2     | 512.6 | 224.5 | 262.5                        | 47.1             | 67.7        | 18.3       | 54.6       |
| 発生程度      | 少                       | 並   | 並     | 多        | 多     | 多     | やや少                          | 並                | 少           | やや少        |            |
| 概 評       |                         | 並   |       |          | 多     |       |                              | 並                |             | やや少~並      |            |

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(7月中旬)

|              | クモヘリカメムシ          |      |       | ホソハリカメムシ |       |       | カスミカメ類  |                               |                     | 斑点米カメムシ類合計 |   |       |
|--------------|-------------------|------|-------|----------|-------|-------|---|-------------------------------|---------------------|------------|---|-------|
|              | 幼虫                | 成虫   | 成幼虫   | 幼虫       | 成虫    | 成幼虫   | アカヒゲ<br>ホソミドリ<br>リカスミ<br>カメ幼虫<br>・アカス<br>ジカスミ<br>カメ幼虫 | アカヒゲ<br>ホソミドリ<br>リカスミ<br>カメ成虫 | アカスジ<br>カスミカ<br>メ成虫 |            |   |       |
| 発生地点数(か所)    | 0                 | 11   | 11    | 7        | 22    | 22    | 25  | 27                            | 24                  | 29         | 総調査地点数: 30<br>(20回振りすくい取り)<br><br>平年値はH24(2012)~<br>令和3(2021)年の平均 |       |
| 発生<br>地点率    | 本年[A](%)          | 0.0  | 36.7  | 36.7     | 23.3  | 73.3  | 73.3  | 83.3                          | 90.0                | 80.0       |   | 96.7  |
|              | 平年[B](%)          | 1.1  | 38.9  | 38.9     | 30.4  | 68.1  | 71.9  | 87.0                          | 90.8                | 89.8       |   | 100.0 |
|              | ([A] / [B]) × 100 | 0.0  | 94.3  | 94.3     | 76.8  | 107.6 | 101.9   | 95.7                          | 99.1                | 89.1       |   | 96.7  |
| 発生程度         | 少                 | 並    | 並     | 並        | 並     | 並     | 並   | 並                             | 並                   | 並          |   |       |
| すくい取り頭数合計(頭) | 0                 | 1404 | 1404  | 32       | 200   | 232   | 5021  | 1545                          | 1009                | 9274       |   |       |
| 頭数           | 本年平均[C](頭)        | 0.0  | 46.8  | 46.8     | 1.1   | 6.7   | 7.7   | 167.4                         | 51.5                | 33.6       | 309.1   |       |
|              | 平年[D](頭)          | 0.0  | 17.8  | 17.8     | 0.5   | 3.0   | 3.5   | 124.9                         | 47.9                | 48.6       | 235.5   |       |
|              | ([C] / [D]) × 100 | 0.0  | 262.9 | 262.6    | 196.8 | 224.7 | 220.4   | 134.0                         | 107.6               | 69.2       | 131.3   |       |
|              | 発生程度              | 少    | 多     | 多        | 多     | 多     | 多   | 並                             | 並                   | 並          | 並   |       |
| 概評           | やや多               |      |       | やや多      |       |       | 並   |                               |                     | 並~<br>やや多  |   |       |

水田における斑点米カメムシ類すくい取り(7月上旬)

|              | クモヘリカメムシ          |     | ホソハリカメムシ |     | アカヒゲホソミドリ<br>リカスミカメ |     | アカスジカスミカ<br>メ |     | 斑点米カメ<br>ムシ類成幼虫 | 備考  |       |
|--------------|-------------------|-----|----------|-----|---------------------|-----|---------------|-----|-----------------|---|-------|
|              | 幼虫                | 成虫  | 幼虫       | 成虫  | 幼虫                  | 成虫  | 幼虫            | 成虫  |                 |   |       |
| 発生ほ場数(か所)    | 0                 | 3   | 0        | 0   | 0                   | 2   | 0             | 0   | 5               | 総調査ほ場数: 39ほ場<br>(20回振り<br>すくい取り)<br><br>平年値はH24(2012)~<br>令和3(2021)年の平均 |       |
| 発生<br>ほ場率    | 発生ほ場率[A](%)       | 0.0 | 7.7      | 0.0 | 0.0                 | 5.1 | 0.0           | 0.0 | 12.8            |   |       |
|              | 発生ほ場率平年値[B](%)    | 0.0 | 4.6      | 0.0 | 1.0                 | 0.3 | 4.9           | 0.3 | 0.8             |   | 11.3  |
|              | ([A] / [B]) × 100 | -   | 167.4    | -   | 0.0                 | 0.0 | 104.1         | 0.0 | 0.0             |   | 113.3 |
| 発生程度         | 少                 | やや多 | 少        | 少   | 少                   | 並   | 少             | 少   | 並               |   |       |
| すくい取り頭数合計(頭) | 0                 | 4   | 0        | 0   | 0                   | 2   | 0             | 0   | 6               |   |       |
| 頭数           | 本年平均値[C](頭)       | 0.0 | 0.1      | 0.0 | 0.0                 | 0.1 | 0.0           | 0.0 | 0.2             |   |       |
|              | 平年値[D](頭)         | 0.0 | 0.1      | 0.0 | 0.0                 | 0.1 | 0.0           | 0.0 | 0.3             |   |       |
|              | ([C] / [D]) × 100 | -   | 100.0    | -   | -                   | -   | 100.0         | -   | -               | 66.7  |       |
|              | 発生程度              | 少   | 並        | 少   | 少                   | 少   | 並             | 少   | 少               | 並   |       |
| 概評           | やや多               |     | 少        |     | 並                   |     | 少             |     | 並               |   |       |

水田すくい取り(7月中旬)

|              | ウンカ類<br>幼虫        | ヒメトビ<br>ウンカ成虫 | セジロウ<br>ンカ成虫 | ヨコバイ<br>類幼虫 | ツマグロ<br>ヨコバイ<br>成虫 | イナズマ<br>ヨコバイ<br>成虫 | イナゴ | イネミズ<br>ソウムシ | フタオビ<br>コヤガ幼虫 | イチモン<br>ジセセリ<br>幼虫 | 備考    |   |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----|--------------|---------------|--------------------|-------|---|
|              | 発生ほ場数(か所)         | 22            | 35           | 2           | 1                  | 10                 | 0   | 25           | 4             | 0                  |       | 1 |
| 発生<br>ほ場率    | 発生ほ場率[A](%)       | 56.4          | 89.7         | 5.1         | 2.6                | 25.6               | 0.0 | 64.1         | 10.3          | 0.0                | 2.6   |   |
|              | 発生ほ場率平年値[B](%)    | 68.4          | 84.8         | 4.6         | 10.6               | 36.0               | 1.5 | 60.9         | 3.8           | 11.8               | 1.0   |   |
|              | ([A] / [B]) × 100 | 82.5          | 105.8        | 110.9       | 24.5               | 71.1               | 0.0 | 105.3        | 271.1         | 0.0                | 260.0 |   |
| 発生程度         | 並                 | 並             | 並            | やや少         | 並                  | 少                  | 並   | 多            | 少             | 多                  |       |   |
| すくい取り頭数合計(頭) | 215               | 546           | 9            | 2           | 14                 | 0                  | 171 | 4            | 0             | 1                  |       |   |
| 頭数           | 本年平均値[C](頭)       | 5.5           | 14.0         | 0.2         | 0.1                | 0.4                | 0.0 | 4.4          | 0.1           | 0.0                | 0.0   |   |
|              | 平年値[D](頭)         | 25.9          | 18.9         | 0.1         | 0.2                | 1.1                | 0.0 | 7.9          | 0.1           | 0.4                | 0.0   |   |
|              | ([C] / [D]) × 100 | 21.2          | 74.0         | 354.5       | 53.0               | 36.3               | 0.0 | 55.6         | 162.5         | 0.0                | 0.0   |   |
|              | 発生程度              | やや少           | 並            | 多           | やや少                | やや少                | 少   | やや少          | やや多           | 少                  | 少     |   |
| 概評           | 並                 | 並             | やや多          | やや少         | 並                  | 少                  | 並   | 多            | 少             | 並                  |       |   |

いちご(育苗床・親株)

|      |       | 単位: % |           |           |     |            |          |            |               |                 | 備考   |
|------|-------|-------|-----------|-----------|-----|------------|----------|------------|---------------|-----------------|--|
|      |       | 炭疽病   | 灰色か<br>び病 | うどん<br>こ病 | 葉黄病 | アブラ<br>ムシ類 | ハダニ<br>類 | コナジ<br>ラミ類 | ハスモン<br>ヨトウ幼虫 | シロイチモ<br>ジヨトウ幼虫 |  |
| ほ場率  | 発生ほ場数 | 2     | 0         | 7         | 0   | 8          | 20       | 4          | 0             | 0               | 総調査ほ場数: 64か所 総調査株数: 1,600株<br>(調査株数 25株(調査花数 50花))<br><br>※平年比 = (本年平均値 / 平年値) × 100 |
|      | 本年平均値 | 3.1   | 0.0       | 10.9      | 0.0 | 12.5       | 31.3     | 6.3        | 0.0           | 0.0             |  |
|      | 平年値   | 1.8   | 0.3       | 39.2      | 0.7 | 17.1       | 32.7     | 13.7       | 0.5           | -               |  |
|      | 平年比   | 172.2 | 0.0       | 27.8      | 0.0 | 73.1       | 95.7     | 46.0       | 0.0           | -               |  |
| 発生程度 | やや多   | 少     | やや少       | 少         | 平年並 | 平年並        | やや少      | 少          | 少             |                 |  |
| 発生株率 | 発生株数  | 0     | 0         | 2         | 0   | 45         | 165      | 4          | 0             | 0               | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                   |
|      | 本年平均値 | 0.0   | 0.0       | 0.1       | 0.0 | 2.8        | 10.3     | 0.3        | 0.0           | 0.0             |  |
|      | 平年値   | 0.0   | 0.0       | 6.8       | 0.0 | 2.6        | 8.2      | 1.0        | 0.0           | -               |  |
|      | 平年比   | -     | -         | 1.5       | -   | 107.7      | 125.6    | 30.0       | -             | -               |  |
| 発生程度 | 少     | 少     | 少         | 少         | 平年並 | 平年並        | やや少      | 少          | 少             |                 |  |
| 概評   | 平年並   | 少     | やや少       | 少         | 平年並 | 平年並        | やや少      | 少          | 少             |                 |  |

トマト

単位：%

|      |       | 灰色かび病 | 疫病  | 葉かび病 | すすかび病 | うどんこ病 | 黄化葉巻病 | モザイク病 | アブラムシ類 | コナジラミ類(葉率) | アザミウマ類(花率) | ハモグリバエ類幼虫 | タバコガ類幼虫および被害 | ハスモンヨトウ幼虫 | 備考   |
|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|--|
| ほ場率  | 発生ほ場数 | 0     | 0   | 0    | 0     | 3     | 0     | 0     | 1      | 4          | 1          | 1         | 0            | 0         | 総調査ほ場数：11か所  |
|      | 本年平均値 | 0.0   | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 27.3  | 0.0   | 0.0   | 9.1    | 36.4       | 9.1        | 9.1       | 0.0          | 0.0       | 総調査株数：550株   |
|      | 平年値   | 6.7   | 0.9 | 16.5 | 20.9  | 58.1  | 4.8   | 0.0   | 3.5    | 45.6       | 12.6       | 15.5      | 7.7          | 0.0       | (調査数：50株、100果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉)                |
|      | 平年比   | 0.0   | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 47.0  | 0.0   | -     | 260.0  | 79.8       | 72.2       | 58.7      | 0.0          | -         | 夏秋トマト  |
|      | 発生程度  | 少     | 少   | 少    | 少     | やや少   | 少     | 少     | 多      | 平年並        | 平年並        | やや少       | 少            | 少         |  |
| 株率   | 発生株数  | 0     | 0   | 0    | 0     | 78    | 0     | 0     | 1      | 7          | 1          | 1         | 0            | 0         | ※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考値。               |
|      | 本年平均値 | 0.0   | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 14.2  | 0.0   | 0.0   | 0.2    | 0.6        | 0.1        | 0.2       | 0.0          | 0.0       | ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。          |
|      | 平年値   | 0.3   | 0.0 | 5.4  | 5.1   | 12.7  | 1.5   | 0.0   | 0.1    | 2.3        | 1.2        | 0.9       | 0.2          | 0.0       |  |
|      | 平年比   | 0.0   | -   | 0.0  | 0.0   | 111.8 | 0.0   | -     | 333.3  | 26.1       | 8.3        | 22.2      | 0.0          | -         |  |
| 発生程度 | 少     | 少     | 少   | 少    | 平年並   | 少     | 少     | 多     | やや少    | 少          | やや少        | 少         | 少            | 少         | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| 概 評  |       | 少     | 少   | 少    | 少     | やや少   | 少     | 少     | 多      | 平年並        | やや少        | やや少       | 少            | 少         |  |

なす

単位：%

|       |        | うどんこ病 | 灰色かび病(葉率) | 青枯病 | 半葉萎凋病 | 輪紋病 | すすかび病(葉率) | アブラムシ類 | ハダニ類(葉率) | アザミウマ類(葉率) | ハスモンヨトウ幼虫(葉率) | タバコガ類幼虫被害(果率) | ハモグリバエ類幼虫 | コナジラミ類成幼虫(葉率) | 備考   |
|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----------|--------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|
| ほ場率   | 発生ほ場数  | 0     | 0         | 0   | 0     | 0   | 0         | 0      | 3        | 7          | 0             | 0             | 0         | 4             | 総調査ほ場数：9か所   |
|       | 本年平均値  | 0.0   | 0.0       | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 33.3     | 77.8       | 0.0           | 0.0           | 0.0       | 44.4          | 総調査株数：450株   |
|       | 平年値    | 21.1  | 1.1       | 0.0 | 4.2   | 0.0 | 1.1       | 32.6   | 47.5     | 76.7       | 1.1           | 6.7           | 7.3       | 63.2          | (調査数 50株、100葉、100果)  |
|       | 平年比    | 0.0   | 0.0       | -   | 0.0   | -   | 0.0       | 0.0    | 70.1     | 101.4      | 0.0           | 0.0           | 0.0       | 70.3          | ※平年比=(平均値/平年値)×100   |
|       | 発生程度   | 少     | 少         | 少   | 少     | 少   | 少         | 少      | 平年並      | 平年並        | 少             | 少             | 少         | 平年並           |  |
| 株率・葉率 | 発生株・葉数 | 0     | 0         | 0   | 0     | 0   | 0         | 0      | 12       | 53         | 0             | 0             | 0         | 5             | ※灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害果率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。 |
|       | 本年平均値  | 0.0   | 0.0       | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 1.3      | 5.9        | 0.0           | 0.0           | 0.0       | 0.6           |  |
|       | 平年値    | 5.9   | 0.0       | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0       | 1.7    | 4.0      | 17.6       | 0.0           | 0.2           | 0.2       | 2.5           |  |
|       | 平年比    | 0.0   | -         | -   | -     | -   | -         | 0.0    | 32.5     | 33.5       | -             | 0.0           | 0.0       | 24.0          |  |
| 発生程度  | 少      | 少     | 少         | 少   | 少     | 少   | 少         | 少      | やや少      | やや少        | 少             | 少             | 少         | やや少           | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント   |
| 概 評   |        | 少     | 少         | 少   | 少     | (少) | 少         | 少      | 平年並      | 平年並        | (少)           | 少             | 少         | 平年並           |  |

きゅうり

単位：%

|       |        | 灰色かび病(株率) | べと病   | うどんこ病 | 褐斑病  | 疫病(株率) | モザイク病(株率) | 黄化えそ病(株率) | アブラムシ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | コナジラミ類 | ハダニ類 | ハスモンヨトウ幼虫(株率) | 備考   |
|-------|--------|-----------|-------|-------|------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------|---------------|--|
| ほ場率   | 発生ほ場数  | 0         | 4     | 1     | 0    | 0      | 0         | 1         | 0      | 3      | 0         | 3      | 0    | 0             | 総調査ほ場数：4か所   |
|       | 本年平均値  | 0.0       | 100.0 | 25.0  | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 25.0      | 0.0    | 75.0   | 0.0       | 75.0   | 0.0  | 0.0           | 総調査葉数：400葉   |
|       | 平年値    | 0.0       | 61.3  | 75.7  | 12.0 | 0.0    | 4.2       | 19.0      | 3.3    | 37.0   | 4.2       | 27.2   | 5.4  | 0.0           | 総調査株数：100株   |
|       | 平年比    | -         | 163.1 | 33.0  | 0.0  | -      | 0.0       | 131.6     | 0.0    | 202.7  | 0.0       | 275.7  | 0.0  | -             | (調査葉数 100葉)  |
|       | 発生程度   | 少         | やや多   | やや少   | 少    | 少      | 少         | 平年並       | 少      | 多      | 少         | 多      | 少    | 少             | (調査株数 25株)   |
| 葉率・株率 | 発生葉・株数 | 0         | 39    | 3     | 0    | 0      | 0         | 1         | 0      | 21     | 0         | 22     | 0    | 0             | ※平年比=(本年平均値/平年値)×100   |
|       | 本年平均値  | 0.0       | 9.8   | 0.8   | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 1.0       | 0.0    | 5.3    | 0.0       | 5.5    | 0.0  | 0.0           | ※灰色かび病は2014年度から、ハスモンヨトウ幼虫は2016年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病は2017年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。 |
|       | 平年値    | 0.0       | 15.4  | 20.5  | 1.5  | 0.0    | 0.1       | 3.7       | 0.0    | 7.0    | 0.1       | 0.9    | 0.1  | 0.0           |  |
|       | 平年比    | -         | 63.6  | 3.9   | 0.0  | -      | 0.0       | 27.0      | 0.0    | 75.7   | 0.0       | 611.1  | 0.0  | -             |  |
| 発生程度  | 少      | 平年並       | 少     | 少     | 少    | 少      | 少         | やや少       | 少      | 平年並    | 少         | 多      | 少    | 少             | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                   |
| 概 評   |        | 少         | やや多   | やや少   | 少    | 少      | 少         | 少         | 平年並    | 少      | やや多       | 少      | 多    | (少)           | 少  |

ねぎ

単位：%

|      |       | さび病  | べと病  | 黒斑症状  | 軟腐病 | 萎縮病 | アブラムシ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | ハスモンヨトウ幼虫 | ネギコガ幼虫 | 備考   |
|------|-------|------|------|-------|-----|-----|--------|--------|-----------|-----------|--------|--|
| ほ場率  | 発生ほ場数 | 3    | 1    | 6     | 0   | 0   | 0      | 4      | 0         | 0         | 0      | 総調査ほ場数：7か所   |
|      | 本年平均値 | 42.9 | 14.3 | 85.7  | 0.0 | 0.0 | 0.0    | 57.1   | 0.0       | 0.0       | 0.0    | 総調査株数：350株   |
|      | 平年値   | 46.6 | 15.4 | 70.5  | 0.0 | 0.0 | 1.3    | 77.9   | 6.8       | 0.0       | 7.9    | (調査株数 50株)   |
|      | 平年比   | 92.1 | 92.9 | 121.6 | -   | -   | 0.0    | 73.3   | 0.0       | -         | 0.0    |  |
|      | 発生程度  | 平年並  | 平年並  | 平年並   | 少   | 少   | 少      | 平年並    | 少         | 少         | 少      | ※平年比=(平均値/平年値)×100                                 |
| 株率   | 発生株数  | 34   | 1    | 16    | 0   | 0   | 0      | 181    | 0         | 0         | 0      | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
|      | 本年平均値 | 9.7  | 0.3  | 4.6   | 0.0 | 0.0 | 0.0    | 51.7   | 0.0       | 0.0       | 0.0    |  |
|      | 平年値   | 11.0 | 1.0  | 11.5  | 0.0 | 0.0 | 0.1    | 51.0   | 0.7       | 0.0       | 0.4    |  |
|      | 平年比   | 88.2 | 30.0 | 40.0  | -   | -   | 0.0    | 101.4  | 0.0       | -         | 0.0    |  |
| 発生程度 | 平年並   | やや少  | やや少  | 少     | 少   | 少   | 平年並    | 少      | 少         | 少         |        |  |
| 概 評  |       | 平年並  | 平年並  | 平年並   | 少   | 少   | 少      | 平年並    | 少         | 少         | 少      |  |

なし

単位：%

|          |       | 黒星病  | 黒星病(果実) | 黒斑病 | 赤星病  | 輪紋病(果実) | 火傷病 | ハダニ類  | ハマキムシ類被害枝率 | サビダニ類被害枝率 | アブラムシ類寄生枝率 | シンクイムシ類(果実) | カメムシ類(果実) | 備考   |
|----------|-------|------|---------|-----|------|---------|-----|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| ほ場率      | 発生ほ場数 | 2    | 2       | 0   | 3    | 0       | 0   | 4     | 0          | 2         | 3          | 0           | 1         | 総調査ほ場数：27か所<br>総調査葉数：10,800葉<br>(調査葉数 400葉)<br>総調査枝・果実数：2,700枝・果実<br>(調査枝・果実数 100枝・果実) |
|          | 本年平均値 | 7.4  | 7.4     | 0.0 | 11.1 | 0.0     | 0.0 | 14.8  | 0.0        | 7.4       | 11.1       | 0.0         | 3.7       |  |
|          | 平年値   | 28.1 | 16.7    | 0.7 | 12.8 | 0.0     | 0.0 | 4.7   | 1.8        | 61        | 27.5       | 1.8         | 0.0       |  |
|          | 平年比   | 26.3 | 44.3    | 0.0 | 86.7 | -       | -   | 314.9 | 0.0        | 12.1      | 40.4       | 0.0         | -         |  |
| 葉率・果率・枝率 | 発生程度  | やや少  | やや少     | 少   | 平年並  | 少       | 少   | 多     | 少          | 少         | やや少        | 少           | -         |  |
|          | 発生葉数  | 1    | 1       | 0   | 10   | 0       | 0   | 8     | 0          | 3         | 98         | 0           | 0         |  |
|          | 本年平均値 | 0.0  | 0.0     | 0.0 | 0.1  | 0.0     | 0.0 | 0.1   | 0.0        | 0.1       | 3.6        | 0.0         | 0.0       | ※平年比=(平均値/平年値)×100   |
|          | 平年値   | 0.3  | 0.1     | 0.0 | 0.1  | 0.0     | 0.0 | 0.0   | 0.1        | 21.2      | 3.3        | 0.0         | 0.0       | ※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始   |
| 概 評      | 発生程度  | 少    | 少       | 少   | 平年並  | 少       | 少   | -     | 少          | 少         | 平年並        | 少           | 少         | ※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での幼虫調査  |
|          | 発生程度  | 少    | 少       | 少   | 平年並  | 少       | 少   | -     | 少          | 少         | 平年並        | 少           | 少         | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                                     |
|          | 発生程度  | 少    | 少       | 少   | 平年並  | 少       | 少   | -     | 少          | 少         | 平年並        | 少           | 少         |  |
|          | 発生程度  | 少    | 少       | 少   | 平年並  | 少       | 少   | -     | 少          | 少         | 平年並        | 少           | 少         |  |

ぶどう

単位：%

|       |       | べと病(葉) | 晩腐病(花穂) | 黒とう病(花穂) | 褐斑病(葉) | 灰色かび病(葉) | アブラムシ類(葉) | ハダニ類(葉) | 備考   |
|-------|-------|--------|---------|----------|--------|----------|-----------|---------|--|
| ほ場率   | 発生ほ場数 | 0      | 0       | 0        | 0      | 0        | 0         | 0       | 総調査ほ場数：10か所<br>総調査葉・花穂数：1,000葉・花穂<br>(調査葉・花穂数：100葉・花穂)<br>※平年比=(本年平均値/平年値)×100 |
|       | 本年平均値 | 0.0    | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0       | 0.0     |  |
|       | 平年値   | 5.3    | 1.3     | 13.7     | 2.1    | 0.0      | 0.0       | 1.3     |  |
|       | 平年比   | 0.0    | 0.0     | 0.0      | 0.0    | -        | -         | 0.0     |  |
| 葉・花穂率 | 発生程度  | 少      | 少       | 少        | 少      | 少        | 少         | 少       |  |
|       | 発生葉数  | 0      | 0       | 0        | 0      | 0        | 0         | 0       |  |
|       | 本年平均値 | 0.0    | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0       | 0.0     | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント                             |
|       | 平年値   | 0.1    | 0.0     | 1.2      | 0.2    | 0.0      | 0.0       | 0.0     |  |
| 平年比   | 0.0   | -      | 0.0     | 0.0      | -      | -        | -         |         |  |
| 概 評   | 発生程度  | 少      | 少       | 少        | 少      | 少        | 少         | 少       |  |
|       | 発生程度  | 少      | 少       | 少        | 少      | 少        | 少         | 少       |  |
|       | 発生程度  | 少      | 少       | 少        | 少      | 少        | 少         | 少       |  |
|       | 発生程度  | 少      | 少       | 少        | 少      | 少        | 少         | 少       |  |

りんご

単位：%

|     |       | 斑点落葉病 | 赤星病   | 褐斑病  | 火傷病 | 黒星病 | 輪紋病(果実) | ハダニ類 | ハマキムシ類幼虫 | アブラムシ類 | シンクイムシ類(果実) | 備考  |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|---------|------|----------|--------|-------------|---|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 6     | 2     | 0    | 0   | 0   | 0       | 0    | 0        | 0      | 0           | 総調査ほ場数：7か所<br>総調査葉数：2,800葉<br>(調査葉数 400葉)<br>(調査果実数 100果)<br>※平年比=(本年平均値/平年値)×100<br>※黒星病はH28年度から調査 |
|     | 本年平均値 | 85.7  | 28.6  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0         |   |
|     | 平年値   | 16.9  | 0.0   | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 7.4  | 0.0      | 6.7    | 0.0         |   |
|     | 平年比   | 507.1 | -     | 0.0  | -   | -   | -       | 0.0  | -        | 0.0    | -           |   |
| 葉率  | 発生程度  | 多     | -     | 少    | 少   | 少   | 少       | 少    | 少        | 少      | 少           |   |
|     | 発生葉数  | 9     | 2     | 0    | 0   | 0   | 0       | 0    | 0        | 0      | 0           |   |
|     | 本年平均値 | 0.3   | 0.1   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0         | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント  |
|     | 平年値   | 0.1   | 0.0   | 0.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 0.4  | 0.0      | 0.0    | 0.0         |   |
| 平年比 | 300.0 | -     | 0.0   | -    | -   | -   | 0.0     | -    | -        | -      |             |   |
| 概 評 | 発生程度  | 多     | (やや多) | 少    | (少) | 少   | 少       | 少    | 少        | 少      | 少           |   |
|     | 発生程度  | 多     | (やや多) | 少    | (少) | 少   | 少       | 少    | 少        | 少      | 少           |   |
|     | 発生程度  | 多     | (やや多) | 少    | (少) | 少   | 少       | 少    | 少        | 少      | 少           |   |
|     | 発生程度  | 多     | (やや多) | 少    | (少) | 少   | 少       | 少    | 少        | 少      | 少           |   |

きく

単位：%

|     |       | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類  | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | ハスモンヨトウ | 備考  |
|-----|-------|------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|---|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0    | 1      | 6     | 3      | 0       | 0      | 0       | 総調査ほ場数：10か所<br>総調査株数：500株<br>(調査株数 50株)<br>※平年比=(平均値/平年値)×100 |
|     | 本年平均値 | 0.0  | 10.0   | 60.0  | 30.0   | 0.0     | 0.0    | 0.0     |   |
|     | 平年値   | 12.9 | 8.3    | 55.3  | 21.4   | 0.0     | 2.1    | 1.0     |   |
|     | 平年比   | 0.0  | 120.5  | 108.5 | 140.2  | -       | 0.0    | 0.0     |   |
| 株率  | 発生程度  | 少    | 平年並    | 平年並   | やや多    | 少       | 少      | 少       |   |
|     | 発生株数  | 0    | 3      | 92    | 2      | 0       | 0      | 0       | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント            |
|     | 本年平均値 | 0.0  | 0.6    | 18.4  | 0.4    | 0.0     | 0.0    | 0.0     |   |
|     | 平年値   | 2.8  | 1.0    | 12.9  | 5.3    | 0.0     | 0.0    | 0.0     |   |
| 概 評 | 発生程度  | 少    | 平年並    | 平年並   | やや少    | (少)     | (少)    | 少       |   |
|     | 発生程度  | 少    | 平年並    | 平年並   | やや少    | (少)     | (少)    | 少       |   |
|     | 発生程度  | 少    | 平年並    | 平年並   | やや少    | (少)     | (少)    | 少       |   |
|     | 発生程度  | 少    | 平年並    | 平年並   | やや少    | (少)     | (少)    | 少       |   |

(注) 概評の( )は、指定有害動物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す