目 的

羽田ミヤコタナゴ生息地保護区(以下,羽田生息地)におけるマツカサガイの生息数を増大させるため,2015年に引き続き,マツカサガイ稚貝を導入した。

材料および方法

現場水路で寄生魚から稚貝を離脱させる導入方法

2016年7月15日,羽田生息地と同水系に位置する水路よりグロキディウム幼生(以下,幼生)を有しているマツカサガイ9個体(平均殻長52.8mm)を採集し,それを空气中に約1時間干した後に水に浸し幼生を放出させ,5Lの幼生懸濁液を作成した。この幼生懸濁液に,大型のトウヨシノボリ235個体(平均全長47.3mm)と小型のトウヨシノボリ260個体(平均全長29.5mm)を収容し,約2時間かけて寄生させた。寄生後,両型のトウヨシノボリをそれぞれ10個体ずつ抽出し,幼生の寄生数を計数した。大型のトウヨシノボリ105個体(残り120個体は次項の研究報告「マツカサガイの人工増殖試験」に使用)と小型のトウヨシノボリ145個体を7月15日に籠に収容し,離脱時期直前の7月24日まで水産試験場内の水路で飼育した。その後,7月25日から7月28日まで羽田生息地の水路最上流部から10m地点(底が軟らかな細礫質で水通しの良い場所)に設置し,稚貝を離脱させることで導入を図った(図1A)。導入した推定稚貝数は,トウヨシノボリの個体数×平均寄生数×稚貝変態割合(85.1%)²⁾により算出した。

離脱稚貝を種籾ネットに収容して導入する方法
稚貝の導入方法としてより簡便な方法を検討するため,残った小型のトウヨシノボリ105個体(前述の幼生寄生済み個体)を水産試験場内で飼育し,7月28日までに離脱した稚貝を細礫入りの種籾ネットに収容し,羽田生息地の水路最上流部に導入した(図1B,C)。導入した推定稚貝数は,前述と同様の方法により算出した。

稚貝の定着調査 稚貝の導入効果を検証するため,2017年2月25日に寄生魚の設置場所から下流30mの範囲において,ザルを用いて底質をふるい稚貝の生息確認を行った。また,稚貝を収容した種籾ネットを回収し,細礫内の稚貝の生息確認を行った。

図1 稚貝導入方法の様子

A: 現場水路で寄生魚から稚貝を離脱させる方法
BとC: 離脱稚貝を種籾ネットに収容する方法

結果および考察

現場水路で寄生魚から稚貝を離脱させる導入方法
大型および小型のトウヨシノボリに寄生していたマツカサガイの幼生数はそれぞれ平均50個体,38個体であり,導入した稚貝数はそれぞれ4,467個体,4,689個体で総計9,156個体の稚貝を導入したと見積もられた。

稚貝の導入から約7カ月後の調査において,導入した0歳のマツカサガイ稚貝は確認されなかった。一方,導入場所から下流16.7mから18.7mの範囲において,1歳とみられる幼貝3個体(殻長18.2-23.8mm),2歳とみられる幼貝1個体(殻長30.0mm)が採集された(図2)。2015年6月と7月には今回と同様の方法で稚貝の導入を図り,2016年3月に今回と同区間で6個体の0歳稚貝が確認されている。つまり,今回の調査で2015年に導入した稚貝が羽田生息地において1歳になるまで順調に生育していたことが分かった。採集さ

図2 採集されたマツカサガイ幼貝

れた地点は水深が平均 9.3 cm, 流速が平均 11.5 cm/s の環境であった (表 1)。また, 底質は粒径 0.06 mm から 4 mm の細粒砂から細礫が主で, 手で底を軽く 5 cm ほど掘れる固すぎない河床状態であったが, 2016 年 3 月に比べて底質がやや細かくなるとともに, 水路の岸際で落ち葉や土の堆積が目立った。

表 1 マツカサガイ幼貝が確認された環境条件

採集位置 (m)	殻長 (mm)	重さ (g)	底質区分	底質粒径 (mm)	河床深さ (cm)	流速 (cm/s)	水深 (cm)	岸際/流芯
16.7	23.8	2.1	2	0.06-2 mm	5	18.2	6	岸際
17.8	30.0	4.4	3	2-4 mm	3	17.1	8	流芯
20.4	18.5	0.2	2	0.06-2 mm	6	9.4	14	岸際
25.3	18.2	0.9	3	2-4 mm	7	1.2	9	岸際

■: 2015年生まれ (1歳)と考えられる個体, □: 2014年生まれ (2歳)と考えられる個体

稚貝が定着しない原因としては, 水温の大きな日較差 (1日の最高水温と最低水温の差) や高水温が考えられるが, 導入から9月までの当年度の水温の日較差は平均 3.2°C, 5°C 以上の日較差があった日数は 12 日間, 10°C 以上の日較差は 2 日間観測されており, 2015 年における日較差の平均 4.1°C, 5°C 以上の日較差 23 日間, 10°C 以上の日較差 4 日間に比べれば抑えられていた。また, 高水温が 30°C 以上の日数は 8 日間と 2016 年の 28 日間よりも著しく少なかった。このことから, 稚貝導入場所の底質環境の変化が稚貝の定着を阻んだ要因の 1 つと考えられる。今後は, 複数の底質環境条件下に稚貝を放流することで定着効果の高い導入場所を明らかにしていく必要がある。

図 3 稚貝を導入した 2015 年と 2016 年における稚貝導入から 9 月までの最高水温と最低水温および日較差の比較

離脱稚貝を種籾ネットに収容し導入する方法 小型のトウシノボリに寄生していたマツカサガイの幼生数は平均 38 個体であり, 導入した稚貝数は 3,395 個体と推定された。導入から約 7 カ月後の稚貝調査では種籾ネット内に定着したマツカサガイの稚貝を確認することはできなかった。稚貝が定着しなかった原因は, 種籾ネットが通水を阻害し, 中の細礫が泥に覆われて

しまったためと考えられる。今後は, 稚貝を泥の溜まりにくい細礫質の環境へ直接放流する方法に絞り, その定着可能性を検証していきたい。

引用文献

- 1) 網川孝俊. ミヤコタナゴ生息地への二枚貝の稚貝導入試験. 栃木県水産試験場研究報告 2017; 60: 52-54.
- 2) 伊藤寿茂・尾田紀夫・丸山隆. マツカサガイのグロキディウム幼生の寄生生態. 日本生態学会誌 2003; 53(3): 187-196.

(指導環境室)