

治療薬（経口薬）について

令和5年4月
栃木県保健福祉部感染症対策課



軽症～中等症 I の患者への治療薬(経口薬)の特徴

一部引用：日本感染症学会「COVID-19に対する薬物治療の考え方第15.1版」 附表1

治療薬名	ラゲブリオ (モルヌピラビル)	パキロビッドパック (ニルマトレルビル/リトナビル)	ゾコーバ (エンシトレルビル)
投与期間	1日2回 5日間	1日2回 5日間	1日1回 5日間
対象患者	重症化因子を有する 軽症～中等症 I	重症化因子を有する 軽症～中等症 I	高熱、又は咳嗽・咽頭痛等の症状が強いもの(症状を考慮し判断)
発症後使用までの推奨日数	5日以内	5日以内	発症から72時間以内
投与量	800mg(4カ ^o ㊦)を1日2回	300/100mgを1日2回	1日目375mg(3錠)、2～5日目125mg(1錠)を1日1回
対象年齢など	18歳以上	12歳以上40kg以上	12歳以上
腎障害時の調整	不要	必要 (程度により減量,非推奨)	不要
妊婦/授乳婦への投与	禁忌 、服用中と服用後4日間の避妊推奨	可	禁忌 、服用中と服用後14日間の避妊推奨
有効性	入院or死亡の相対リスク減少率※1：30%	入院or死亡の相対リスク減少率※1：89%	主要5症状(※2)の改善
ミコシ株への有効性	○	○	○
一般流通	あり	あり	あり
薬価	1カ ^o ㊦ 2,357.80円 (一治療：94,312円)	1シート 19,805.50円 (一治療：99,027.5円)	1錠 7407.40円 (一治療：51,851.8円)
その他特徴 注意点	同意書必要 国購入品の管理 (期限,廃棄不可)	併用薬に留意 が必要 同意書必要 国購入品の管理 (期限,廃棄不可)	併用薬に留意 が必要 同意書必要 国購入品の管理 (期限,廃棄不可)

※1 有効性は薬剤間で直接比較できるものではないことに注意

※2 主要5症状：①倦怠感又は疲労感、②熱っぽさ又は発熱、③鼻水又は鼻づまり、④喉の痛み、⑤咳