[様式２]

(受検者名)　　様

麻しん・風しん抗体検査結果通知書

(医療機関名)

麻しん抗体検査結果（ＥＩＡ法）

１　16.0以上

２　2.0～15.9

３　2.0未満

風しん抗体検査結果（ＨＩ法）

１　３２倍以上

２　８倍、１６倍

３　８倍未満

※該当する結果に○をつけてください

（上記の方法以外）　　（　　法　）

※麻しん【ＥＩＡ法】、風しん【ＨＩ法】以外で検査した場合は、測定値と（　）内に検査方法を記載してください。

＜参考＞

麻しん

16.0以上：麻しんの感染予防に十分な免疫を保有していると考えられます。今すぐのワクチン接種は必要ありません。

2.0～15.9：麻しんの免疫はありますが、麻しんの感染予防には不十分です。過去の予防接種の記録がない場合、**あと１回のワクチンの接種を推奨します。**

2.0未満：免疫を保有していないため、過去の予防接種記録がない場合、**あと２回のワクチンの接種を推奨します。**

出典：日本環境感染学会

風しん

３２倍以上：風しんの感染予防に十分な免疫を保有していると考えられます。ワクチンの接種は、基本的に必要ありません。

８倍、１６倍：過去の感染や予防接種により風しんの免疫はありますが、風しんの感染予防には不十分です。確実な予防のため、**ワクチンの接種を推奨します。**

８倍未満：免疫を保有していないため、**ワクチンの接種を推奨します。**

出典：厚生労働省

◇麻しん風しん混合ワクチン接種について◇

① 妊娠している女性及び妊娠している可能性がある女性はワクチン接種を受けることはできません。

② 女性の場合、ワクチン接種後は少なくとも２か月間の避妊が必要です。

③ 一部市町ではワクチン接種の助成を行っているところがあります。事前に助成の有無及び対象となる医療機関について、お住まいの市町予防接種担当課へお問い合わせ下さい。

[様式２]

(受検者名)　　様

風しん抗体検査結果通知書

(医療機関名)

風しん抗体検査結果（ＨＩ法）

１　３２倍以上

２　８倍、１６倍

３　８倍未満

※該当する結果に○をつけてください

（ＨＩ法以外）　　（　　法　）

※HI 法以外で検査した場合は、測定値と（　）内に検査方法を記載してください。

＜参　考＞　出典：厚生労働省

３２倍以上　・・・風しんの感染予防に十分な免疫を保有していると考えられます。ワクチンの接種は、基本的に必要ありません。

８倍、１６倍　・・・過去の感染や予防接種により風しんの免疫はありますが、風しんの感染予防には不十分です。確実な予防のため、**ワクチンの接種を推奨します。**

８倍未満　・・・免疫を保有していないため、**ワクチンの接種を推奨します。**

◇風しんワクチン接種について◇

① 妊娠している女性及び妊娠している可能性がある女性はワクチン接種を受けることはできません。

② 女性の場合、ワクチン接種後は少なくとも２か月間の避妊が必要です。

③ 一部市町ではワクチン接種の助成を行っているところがあります。事前に助成の有無及び対象となる医療機関について、お住まいの市町予防接種担当課へお問い合わせ下さい。

[様式２]

(受検者名)　　様

麻しん抗体検査結果通知書

(医療機関名)

麻しん抗体検査結果（ＥＩＡ法）

１　16.0 以上

２　2.0～15.9

３　2.0 未満

※該当する結果に○をつけてください

（ＥＩＡ法以外）　　（　　法　）

※ＥＩＡ法以外で検査した場合は、測定値と(　)内に検査方法を記載してください。

＜参　考＞　出典：日本環境感染学会

16.0 以上　・・・麻しんの感染予防に十分な免疫を保有していると考えられます。今すぐのワクチン接種は必要ありません。

2.0～15.9　・・・麻しんの免疫はありますが、麻しんの感染予防には不十分です。過去の予防接種の記録がない場合、**あと１回のワクチンの接種を推奨します。**

2.0 未満　・・・免疫を保有していないため、過去の予防接種記録がない場合、**あと２回のワクチンの接種を推奨します。**

◇麻しんワクチン接種について◇

① 妊娠している女性及び妊娠している可能性がある女性はワクチン接種を受けることはできません。

② 女性の場合、ワクチン接種後は少なくとも２か月間の避妊が必要です。

③ 一部市町ではワクチン接種の助成を行っているところがあります。事前に助成の有無及び対象となる医療機関について、お住まいの市町予防接種担当課へお問い合わせ下さい。