
# 県東地区の健康課題は?

県東地区は、脳血管疾患・心筋梗塞による死亡率が高いことに加え、そのリスク 要因である高血圧者、肥満者、喫煙者などの割合が県平均より高くなっています!

#### 脳血管疾患(脳卒中、脳梗塞など)で亡くなる方が多い!


県東地区は県と比較して高い傾向で、特に益子町の女性が高くなっています。



【脳血管疾患標準化死亡比 県・保健所・市町別(平成22~26年)】

### 高血圧者の割合は、男女とも3人に1人と多い


高血圧者の割合は、男女とも約3割と高く、50歳代男性、40歳代女性で増加する傾向です。



【国民健康・栄養調査、県民健康・栄養調査】

### 年に一度も血圧を測定していない人は、男性5人に1人、女性4人に1人


年に一度も血圧を測定していない人の割合は、男性 22.0%、女性 25.6%で、男女 とも 20~40 歳代で多くなっています。



【県民健康・栄養調査】

### 県東地区は、男女とも、全国、県と比較して肥満者の割合が高い!


男性は前回調査より減少、女性は増加していますが、男女とも全国、県と比較して肥満者の割合が高く、男女とも約3人に1人が肥満となっています。



【国民健康・栄養調査、県民健康・栄養調査】

### 県東地区は、肥満傾向児の割合が県内で最も高い!


申告された身長・体重から「肥満度の判定基準」に基づいて算定した結果は、「太りすぎ」「やや太りすぎ」「太り気味」を合わせると 8.5%と県内で最も高くなっています。



【平成27年度子どもと家族の食生活等実態調査】 ※子どもの対象年齢は、3~6歳児

### 喫煙率は減少しているが、県と比較して高い!


喫煙率は減少傾向ですが、県東地区は、県と比較して高くなっています。



【県民健康・栄養調査】

#### 父親・母親が喫煙している割合は、父親が4割、母親が1割強


同居家族の内、父親、母親が喫煙している割合は、父親が43.9%、母親が14.8%と高く、特に母親が喫煙している割合は県内で最も高くなっています。



【平成27年度子どもと家族の食生活等実態調査】 ※子どもの年齢は、3~6歳児

### 歩行数は、全国と比べて少なく、ほぼ全ての年代で横ばい


前回調査と比較して横ばいですが、依然として全国に比べて少なくなっています。



【国民健康・栄養調査、県民健康・栄養調査】

#### 脂っこいものを控えている人は、男性約5割、女性約7割


脂っこいものを控えている人は、男女とも年齢があがるほど、また、男性より女性 の方が多くなっています。



【県民健康・栄養調査】

### 塩分を控えている人は、男性5割強、女性7割


塩分を控えている人の割合は、男性 55.8%、女性 72.2%で、男性よりも女性の方が 多く、県とほぼ同じ傾向です。



【平成28年度県民健康・栄養調査】

### 食塩摂取量は減少しているが、目標摂取量より多い

食塩摂取量は、20歳以上の1人1日あたり、男性は10.7g、女性は9.1gで男女とも減少傾向ですが、男女とも7割以上の人が目標摂取量より多くとっています。



【国民健康・栄養調査、県民健康・栄養調査】

#### 食塩の摂取状況(20歳以上)


27 20/ (72 70/) 20 00/ (70	満 7g以上	7g 未満	女 性	8g 以上	8g 未満	男性
21.5% (12.1%) 30.0% (10.	% (70.0%)	30.0%		(72.7%)	27.3%	1

食塩摂取量の目標 男性8g未満 女性7g未満

【平成28年度県民健康・栄養調査】

# しょうゆや塩、味噌などの調味料から食塩を多くとっている


食塩は、その7割弱をしょうゆ、塩、みそなどの調味料からとっています。



【平成 28 年度県民健康・栄養調査】

#### 子どもがふだん食べているおやつは、「スナック菓子」が最も多い


子どもがふだん食べているおやつは、スナック菓子が 47.5%と最も多く、次に 甘いお菓子が 30.6%と多かった。 県東地区の肥満傾向児をみると、スナック菓子、甘いお菓子、甘い飲み物が多い傾向にあった。



【平成27年度子どもと家族の食生活等実態調査】 ※肥満傾向児:肥満度の判定基準の「太りすぎ」 「やや太りすぎ」「太り気味」の子ども

# 就寝2時間以内におやつをとる子どもが、県内で最も多い!

就寝 2 時間以内におやつをとることが「よくある」「たまにある」子どもは、 52.3%で、県内で最も高かった。



【平成 27 年度子どもと家族の食生活等実態調査】