

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく慣行レベル

施行日 令和8(2026)年4月1日

作目	作型等	は種又は移植時期 (目安)	化学肥料施用量 (窒素成分量:kg/10a)	化学合成農薬の 成分使用回数
水稻			8	15
二条大麦		10下～11中	7	5
六条大麦		10下～11中	7	5
小麦	製粉用	10下～11中	7	5
	醸造用	10下～11中	13	5
	パン用	10下～11中	15	5
大豆		6中～下	2	11
そば		8中～9上	2	0
はとむぎ		5上～下	13	6
さといも		3下～4上	22	5
ばれいしょ		3中	10	7
かんしょ		5中	4	11
やまのいも			22	7
いちご	促成	8上～9下	20	50
	促成(長期どり)	7中～8上	45	41
トマト	促成(冬春どり)	8下～9下	30	34
	普通(夏秋どり)	1上～2上	30	22
なす	促成	7上～8上	45	47
	半促成	11上～12上	44	25
	普通(夏秋どり)	2上～下	30	34
	促成(冬春どり)	9上～12上	40	51
きゅうり	半促成(初夏どり)	1上～3上	35	28
	普通(夏秋どり)	3上～4上	30	36
	抑制(秋どり)	7上～8下	15	28
メロン			11	15
かぼちゃ		3上～4上	12	7
すいか		2下～	20	12
にがうり			27	8
ズッキーニ		4上～5中	20	8
だいこん	春どり	11下～1上	15	5
	夏どり	5下～7下	18	6
	秋冬どり	8下～9中	15	8
かぶ		1下～6中	16	6
にんじん	秋冬どり	7下～8上	13	11
ごぼう	秋どり	3下～5中	23	5
にら			42	24
ねぎ	夏どり	2下～3下	15	17
	冬春どり	3下～4中	20	19
たまねぎ		9上～10中	25	23
らっきょう		9中	12	3
はくさい	春どり	1上～1下	17	6
	秋冬どり	8中	19	12
キャベツ	初夏どり	9下～2下	15	12
	秋冬どり	5下～7下	15	15
こまつな			14	14
ほうれんそう	夏どり	5下～8下	18	8
	冬春どり	10上～11下	17	8
レタス	秋冬どり	8上～9上	15	11
	春どり	9上～1中	18	8
しゅんぎく	冬春どり	9下～10下	25	10
なばな類			21	1
ブロッコリー	春夏どり	3上～4中	22	8
	秋どり	7上～8下	22	10
カリフラワー	秋どり	7中	16	4
うど		4中～5中	12	8
アスパラガス			34	20
ふき			10	2
にんにく			19	13
しょうが		4中～4下	22	19
未成熟とうもろこし		3上～5中	23	8
さやえんどう			8	3
えだまめ	露地	5中～7下	9	7
オクラ		5上～5下	18	6
なし	露地		20	41
ぶどう	露地		8	26
	ハウス		8	16
りんご	露地		6	48
もも	露地		10	26
とうとう	雨よけ		8	22
うめ	露地		10	9
くり	露地		15	7
ブルーベリー	露地		5	5
きく	スプレー		20	23
	輪ざく		25	33
カーネーション			29	31
りんどう			23	29
トルコギキョウ			8	40
ゆうがお	露地	3下～4上	30	12
こんにゃく		5中～6上	14	9
茶			46	12
飼料用米※			11	9
飼料用イネ※			11	7
飼料用とうもろこし		4下～6下	8	4
イタリアンライグラス		9下～10下	9	1

※専用品種