


「カメムシ防除作戦」実施中!

栃木県HP内に「カメムシ防除作戦」のサイトを開設しました

発信情報その1 カメムシの発生予報

5月～9月まで、週に1回のペースで県内各地点のフェロモントラップ調査で誘殺されたカメムシの数等を発信しています。



栃木県ホームページに掲載する発生予報等新着情報は、栃木県農業防災LINEに配信します

発信情報その2 カメムシの防除対策

品目別の「防除対策技術情報」を発信しています。発生ピークや発生予報を確認し適期に防除しましょう。



チャバネアオ
カメムシ



ミナミアオ
カメムシ



イネカメムシ(幼虫)

栃木県農業防災LINEで
カメムシの発生予報を確認できます

発生予報を参考に、ほ場の見回りを強化し
早期発見・早期防除に努めましょう



LINE
(栃木県公式アカウント)

気象情報や技術対策など
農業気象災害への備えや
気候変動への適応に必要な
情報をお届けします!


カメムシ情報も
随時発信中

QRコードもしくはIDから
お友だち登録を



LINE ID

@756bxcgu



お問合せ先

防除対策の内容について 栃木県農政部経営技術課
カメムシ防除作戦について 栃木県農政部生産振興課

TEL 028-623-2322

FAX 028-623-2315

TEL 028-623-2326

FAX 028-623-2335

成虫



幼虫



イネカメムシの 適期防除に努めましょう！

令和7年6月

栃木県農政部経営技術課

イネカメムシによる不稔の防止 出穂期防除が必須

気象庁の3ヶ月予報では、高温で経過する可能性が高い

出穂は昨年並みに早まる可能性あり

令和6（2024）年 生育診断基本調査における出穂期
早植コシヒカリ：7月23日 早植とちぎの星：7月28日
普通植とちぎの星：8月13日 ※ 出穂期の日付は昨年の県内平均




写真 出穂した穂

気温、降水量の各階級の確率（％）					
気温	関東甲信 地方	06月～08月	10	30	60
		06月	10	30	60
		07月	20	30	50
		08月	20	30	50

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い

出穂期の被害

不稔で
収量が低下

注 意

葉鞘からわずかでも穂が出ていれば出穂です。
ほ場全体の4～5割出穂していれば出穂期となります。

7月上中旬 →	出穂期	穂揃期	乳熟初期	乳熟後期以降 →	収穫後
(1) 発生初期の把握	(2) 薬剤防除の実施				(3) 耕うん
イネカメムシ 対策	薬剤散布 1回目	7～10日後	薬剤散布 2回目	7～10日後	秋耕
	不稔 防止		斑点米 防止	追加防除 3回目 斑点米 防止	生息場所 除去

図 イネカメムシの発生地域における斑点米カメムシ類の総合防除対策の体系