

- ◆ 5月上旬植えのコシヒカリの刈取り開始は、  
鹿沼市⇒7月25日出穂の場合、8月29日(木)頃から  
7月31日出穂の場合、9月4日(土)頃から  
日光市⇒7月28日出穂の場合、9月3日(金)頃から  
8月 1日出穂の場合、9月7日(火)頃から です！
- ◆ 出穂が早まったほ場は、刈り遅れないように注意しましょう！


## ○適期収穫で1等米比率向上！

- 上都賀地域は刈り遅れ傾向で、胴割米が多発しています。  
今年鹿沼市で出穂が早まりました。収穫作業を周りに合わせるのではなくほ場の帯緑色籾率を確認し、10%になったら収穫を開始しましょう。
- **刈り遅れは品質に大きく影響します！**  
**帯緑色籾率3%で刈取りが終了できるように努めましょう！**

## ○水管理


- **登熟期間は水を必要とする時期**なので、不足しないようにこまめな**間断かん水**を行いましょ。出穂後30日までは、**間断かん水を続けましょ！**

【帯緑色籾率とは？】



帯緑色籾率とは、穂のもとに残っている**黄緑色の籾の割合**。10~3%が刈り取り適期です！

刈取り準備をしましょ



← 刈取り適期 →

帯緑色籾率	15%	10%	3%
出穂後日数	35日	38日	46日

【図1 刈取適期の目安】

葉は青々としているが、籾は刈取適期を過ぎているよ！籾が全部黄色くなってからでは刈り遅れです！！




(裏面に続く)

# 令和3年産 水稲収穫適期予測(8月26日現在)

※アメダス(鹿沼、今市)を用いた積算気温による成熟期および刈取り適期予想。積算気温は、8月24日までは本年実測値、8月25日以降は平年値を用いて積算。成熟期は、出穂期からの積算温度1000~1100℃を示す。

## 鹿沼市



## 日光市

