

上都賀地域及び周辺の葉いもち感染好適条件判定結果(BLASTAM)

7/8現在、宇都宮市で7/1と7/4に感染好適日が、日光東町では7/3に感染好適日その前後で準感染好適日が出現しています。
感染好適日が出現した7～10日後に、葉いもちの発生があると考えられています。
いもち病の常発地ではほ場をよく見回り、病斑を確認したら薬剤の散布を行いましょう。

	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
日光東町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	④	③	－	－	－	－	－	－	－	－	①	－	③	－	－	－	①	①	－
塩谷	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	④	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	④	①	①	－	－	－	－
鹿沼	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	④	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	④	－	④	－	－	●	－
宇都宮	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	④	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
日光東町	－	④	●	①	④	－	①	－	－	－	－																				
塩谷	－	－	④	－	－	－	④	－	－	－	－																				
鹿沼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																				
宇都宮	●	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－																				

●	感染好適条件	⑦ 葉面湿潤時間が10時間以上 ① 葉面湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ ② 前5日間の平均気温が20℃～25℃	} ⑦①②の条件が満たされると、葉いもちの感染に好適と判定される。
①	} 準感染好適条件	⑦①を満たすが、②を満たさない。(前5日間の平均気温が20℃未満)	
②		⑦①を満たすが、②を満たさない。(前5日間の平均気温が25℃以上)	
③		⑦を満たすが、①が15℃～25℃の範囲外	
④		葉面湿潤時間中の平均気温ごとに必要ない時間数より短い。	
－	好適条件無し		
？	判定不能		

※ BLASTAM(ブラスタム)…アメダスデータを用いて、広域に葉いもちが感染する時期を推定するシステムです。
(あくまで推定のため、常発地やほ場条件により、実際の発生と異なる場合があります。)