


斑点米カメムシ類発生状況(9/1現在)

今年度のすくい取り調査において、鹿沼市及び日光市の合計4ほ場で、**イネカメムシの発生を確認**しています。
イネカメムシに吸汁された籾は、不稔粒となるため減収につながります。
移植が遅いほ場では、**適期に薬剤散布を行ってください。**(水稻生育診断速報第4号参照)
斑点米カメムシ類等害虫の越冬場所とならないよう、収穫後のほ場は**速やかに秋耕**を行いましょう。



クモヘリカメムシ




ホソハリカメムシ



アカシジ カスミカメ



アカヒゲ ホソミト リカスミカメ



イネカメムシ

本田すくい取り調査(鹿沼市・捕獲地点のみ掲載)

(頭/20回振り)

調査日	7月13日	7月13日	7月21日	7月23日	7月23日	8月6日	8月21日	9月1日	9月1日
調査地点	鹿沼市見野	鹿沼市富岡	鹿沼市久野	鹿沼市口栗野	鹿沼市久野	鹿沼市楡木	鹿沼市佐目町	鹿沼市楡木	鹿沼市下石川
水稻生育ステージ	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂期	穂揃い期	出穂始め	出穂期	穂揃い期
クモヘリカメムシ	27	70	24	1	0	0	6	2	10
ホソハリカメムシ	1	0	0	1	1	0	0	0	0
イネカメムシ	0	0	0	0	0	1	0	3	6
アカヒゲ ホソミト リカスミカメ	0	0	0	1	0	0	0	0	0
アカシジ カスミカメ	0	0	0	1	0	0	0	0	0

(飼料用米)

(飼料用米)

本田すくい取り調査(日光市・捕獲地点のみ掲載)

(頭/20回振り)

調査日	7月21日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
調査地点	日光市本和田島	日光市吉沢	日光市明神	日光市小林	日光市土沢	日光市岩崎	日光市薄井沢
水稻生育ステージ	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂期	出穂期	出穂期
クモヘリカメムシ	5	8	9	1	66	22	1
ホソハリカメムシ	3	1	0	2	2	1	0
イネカメムシ	0	0	0	0	0	1	0
アカヒゲ ホソミト リカスミカメ	0	0	0	0	0	2	0
アカシジ カスミカメ	0	0	0	0	0	0	0

防除が必要になる目安
(要防除水準)

穂揃い期に、20回すくい取り
調査でクモヘリカメムシ成虫
1頭以上

または、
出穂15日後に、20回すくい
取り調査でクモヘリカメムシ
幼虫2頭以上

白色粘着トラップ調査(粘着板のみ)


(頭)

日光市本和田島	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日	8月3日	8月10日	8月18日	8月27日
クモヘリカメムシ	0	0	58	5	0	0	0	0	0
ホソハリカメムシ	0	0	0	1	0	0	0	0	0
イネカメムシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(小型が除く)	0	0	58	6	0	0	0	0	0
(参考)R7	0	クモリ4	クモリ14	クモリ14	0	クモリ2	0	0	0

鹿沼市久野	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日	8月3日	8月10日	8月18日	8月25日
クモヘリカメムシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホソハリカメムシ	0	0	1	1	0	0	0	0	0
イネカメムシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(小型が除く)	0	0	1	1	0	0	0	0	0
(参考)R7	ホソリ1	ホソリ1	0	0	0	0	0	0	ホソリ1



すくい取り調査



例:白色粘着トラップ調査(囲みはクモヘリカメムシ)



9/1に捕獲したイネカメムシ