

令和7年下都賀管内イネカメムシトラップMAP

下都賀農業振興事務所

- ・イネカメムシの水田への飛び込みを調査する「白色粘着トラップ」を、管内10箇所に設置しています。
- ・調査開始以降、イネカメムシが捕獲されています。
△ほ場をよく確認し、水稻の生育に合わせて防除を行いましょう。△
- ・防除適期
1回目：出穂期（不稔予防）
2回目：出穂期の1週間後（不稔・斑点米予防）
※イネカメムシの発生が多い場合は、薬剤の使用回数に注意して追加防除を行いましょう。



表1 イネカメムシ粘着板調査結果

市町名	トラップ名	品種	移植日	イネカメムシ初捕獲時期	初捕獲時期の水稻生育ステージ
栃木市	A	とちぎの星	4月下旬	6月30日～7月7日	幼穂形成期
	B	とちぎの星	5月上旬	6月30日～7月11日	幼穂形成期
	C	とちぎの星	4月下旬	6月30日～7月7日	幼穂形成期
	D	あさひの夢	5月下旬	6月30日～7月11日	分けつ期
	E	あさひの夢	5月下旬	6月30日～7月11日	分けつ期
	F	とちぎの星	5月中旬	—	—
小山市	G	とちぎの星	6月上旬	—	—
	H	コシヒカリ	5月上旬	6月30日～7月7日	幼穂形成期
野木町	I	コシヒカリ	5月上旬	6月20日～6月30日	幼穂形成期
	J	とちぎの星	6月上旬	6月30日～7月11日	分けつ期

問い合わせ先

栃木県下都賀農業振興事務所 経営普及部 農畜産課 0282-24-1101

HP <http://www.pref.tochigi.lg.jp/g54/index.html>