

下都賀管内水稻技術資料

令和8年8月20日
下都賀農業振興事務所

重点ポイント

① 早期落水は品質低下につながります。

落水は出穂後30日以降に行いましょう！

② 帯緑色籾率を確認し、適期収穫に努めましょう！



★早植刈取り開始予測（※実際はほ場を観察しましょう）

- ・コシヒカリ⇒7月20日出穂の場合、8月26日（水）頃から
7月25日出穂の場合、9月1日（火）頃から
- ・とちぎの星⇒7月31日出穂の場合、9月16日（水）頃から
8月5日出穂の場合、9月22日（火）頃から


1 水管理

- ・登熟期間は水を必要とする時期なので、不足しないように間断かん水を行いましょう。
- ・落水時期は、出穂後30日以降です。早期落水は絶対に行わないようにしましょう。

2 適期収穫

- ・葉が青い場合でも、刈取適期を過ぎていることがあります。
刈取適期を逃さないように、**帯緑色籾率（刈取適期目安：10～3%）**と**登熟積算温度（次ページ参照）**で総合的に判断して、刈り遅れのないようにしましょう。

【帯緑色籾率とは？】



帯緑色籾

帯緑色籾率とは、穂のもとに残っている**黄緑色の籾の割合**。**10～3%**が刈り取り適期です！

刈取り準備を
しましょう

刈取り適期



帯緑色籾率

15%


10%

3%


【図 刈取適期の目安】

令和8年産 水稻収穫適期予測（8月19日現在）

コシヒカリ



とちぎの星



※積算気温は、8月18日までは本年実測値、8月19日以降は平年値を用いた。（小山アメダス）
コシヒカリの登熟積算温度は、出穂期から日平均気温の積算 1,000～1,100°C。
とちぎの星の登熟積算温度は、出穂期から日平均気温の積算 1,200～1,300°C。