

稲・麦・大豆かわら版

～水稻編(雑草イネ対策)～

2025.10.20 発行
栃木県塩谷南那須農業振興事務所
経営普及部 0287-43-2318
<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g55/>

1 雑草イネの特徴

- (1) 極めて脱粒しやすく、水田内で容易に拡散する
- (2) 農業機械（コンバイン、ロータリー等）に付着して他の水田へも拡散する
- (3) 放置すると収穫した玄米に混入し、異品種混入の被害をもたらす
- (4) 雑草イネも「イネ」であるため、水稻除草剤があまり効かない
- (5) 休眠性がありダラダラと発生するため、除草剤の1回処理では防除しきれない

→蔓延すると、品質や収量の低下を引き起こすだけでなく、販売が困難になり経営的に大きなダメージを受ける

Q. あなたの水稻栽培ほ場に、
このようなイネはありませんでしたか？



1	2	3	4
			
・風や接触によって容易に脱粒する	・粳または玄米が着色している ・出荷時の検査で「着色米」や「赤米」混入の指摘を受けた	・芒（のげ）が長い、ふ先が着色している	・栽培品種と出穂期や草丈、稈長が異なる

これら（特に1と2）に該当する場合、それは「雑草イネ」かもしれません！！
→裏面の防除対策を参考にして、「雑草イネ」防除を徹底しましょう！

9月～11月は「秋の農作業安全確認運動」の実施期間です。


高齢農業者の事故が多発しています！以下のことを心がけましょう。

- ・こまめな休息や健康診断の受診等、疲労回復と健康管理の徹底
- ・歩行型トラクターでのバックの際は、必ず後方と足元の安全確認を
- ・複数人での作業を基本とし、一人での作業の場合は携帯電話を持つ



2 雑草イネ防除方法 <一度発生すると、3年間は徹底した防除が必要です！>

	収穫後・作付前							本田期間(水稻作付期間)					
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
内容	①収穫後、不耕起							効果中					
	②非選択性除草剤の散布 (ヒコバエ防除)			効果中			②非選択性除草剤の散布 (出芽個体防除)	効果中	⑤遅播・遅植	効果大			
	③石灰窒素散布			効果中				効果大	⑥除草剤の体系処理		⑦手取り除草	効果大	
	④田畑転換(麦・大豆・そば等への転換)												効果大
効果・留意点	①収穫後、不耕起							⑥除草剤の体系処理					
	・冬の寒さと乾燥で地表面のこぼれ粃を腐敗、死滅させる							・雑草イネに効果のある除草剤を散布する					
	②非選択性除草剤の散布							・効果が低い剤でも1葉期を過ぎると効果が劣るため、使用時期の最も早い時期に使う					
	・ヒコバエや発芽粃を枯らす							→【表1】参照					
	・こぼれ粃からの発芽粃を枯らす												
③石灰窒素散布													
・地表面にこぼれた粃を枯らす													
※稲わら除去後散布を行う													
④田畑転換													
・こぼれ粃からの発芽粃を枯らす													
⑤遅播・遅植													
・播種を遅らせ、こぼれた粃を先に出芽させ土壌中に埋め込む													



3 除草剤の体系処理

3 除草剤の体系処理

移植日

(移植前・後日数)

-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

1回目

初期剤A

または

初期剤B

移植時～移植後3日以内に除草剤処理(※登録された使用時期に注意)

2回目

初中期一発剤

【表1】 移植水稻栽培における主な除草剤 (登録情報：令和7年10月15日現在)

区分	商品名	成分	使用時期	使用回数
初期剤A・B	エリジャンジャンボ	プレチクロール	植代後～移植前7日 移植直後～ノビエ1葉期	1回
	ソルネット1キロ粒剤		植代後～移植前7日 移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後～ノビエ1葉期	
	メテオ1キロ粒剤	ペントキサゾン	移植直後～ノビエ1葉期	2回以内
初期剤B	マキシ-MX1キロ粒剤	プレチクロール メトリオン	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後～ノビエ1.5葉期	1回
初中期一発剤	かねつぐ1キロ粒剤	シクロスルフアムロン プレチクロール	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後～ノビエ1.5葉期	1回
	ボデーガード1キロ粒剤	テフリトリオン フェントラザミド	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後～ノビエ3葉期	

※いずれも移植後30日までが使用期限

★農薬は使用前に必ずラベルを読み、使用時期・使用方法を確認して正しく使用しましょう！