

生育診断ほ調査結果と今後の管理

令和 8 (2026) 年 7 月 8 日

那須農業振興事務所

- ・ **出穂期：北部は 7/31 頃、南部は 7/24 頃と予測**
→各ほ場で幼穂長を確認し、おおよその出穂期を予測
しましょう！（カメムシ対策等に役立ちます）
- ・ **カメムシ対策のために、草刈りを始めましょう！**

1 現在の生育状況


水稻生育診断ほ調査結果(調査日：7/6、品種：コシヒカリ、施肥：全量基肥)

調査地点	移植日	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢	葉色 (葉色板)	幼穂長 (mm)	生育診断値 (葉色×茎数)
北部 (那須町寺子丙)	5/10	53.3	398	9.9	3.9	0.8	1,570
		69%	88%	-1.7	+0.6	-0.8	105%
南部 (那須塩原市一区町)	5/2	71.7	587	11.9	4.4	7.5	2,566
		80%	134%	+0.3	+0.4	-0.7	136%

※下段は前年比及び前年差

栽植密度は、北部：20.0 株/㎡、南部：18.2 株/㎡

- ・ 草 丈：前年と比べて北部はかなり低く、南部は低い
 - ・ 茎 数：前年と比べて北部はやや少なく、南部はかなり多い
 - ・ 葉 齢：前年と比べて北部は 1.7 枚少なく、南部は 0.3 枚多い
 - ・ 葉 色：北部、南部ともに前年よりやや濃い
 - ・ 幼穂長：前年と比べて北部は 0.8mm 短く、南部は 0.7mm 短い
- 出穂期は北部で 7/31 頃、南部で 7/24 頃になると予測**
(前年値：北部 7/29、南部 7/22)
出穂期を予測する際には、右表を参考にしてください



左：幼穂長 約 1.5mm (出穂前 23 日程度)
右：幼穂長 約 8.5mm (出穂前 18 日程度)

2 今後の管理

(1) 水管理

- ・ 今後も水管理は、**間断かん水が基本**
- ・ 出穂期（ほ場全体の 4～5 割が出穂）頃は、水稻が最も水を必要とする時期なので、水を切らさないよう注意しましょう

表 1 コシヒカリの幼穂長と出穂前日数

幼穂長 (mm)	出穂前日数
0.8	25
3.6	20
17.2	15
72.9	10
187.3	5

※安心イネつくりより抜粋

表 2 イネの生育ステージごとの水を入れるタイミング

生育ステージ	水を入れるタイミング
目標茎数確保前～出穂期前	ほ場の足跡に水が残るくらい
出穂期前～開花期頃	田面が露出する前 (水がなくならないように注意！)
開花期～出穂後 30 日	水が完全に無くなる前 (出穂後 30 日までは早期落水をしない)


(2) 斑点米カメムシ対策

- 斑点米カメムシ防除のための草刈りは、**1回目：出穂期2～3週間前、2回目：出穂期直前の、計2回**行うことが効果的
- 7/6時点での出穂期予測では、現在は2調査地点において草刈り1回目の時期（右図）
→表面の表1を参考に、おおよその出穂期を予測して、**草刈りを始めましょう！**
- 近年の高温により、カメムシ類の越冬数や発生回数は増加傾向にあるため、**複数回の防除が有効**です
特に発生が多い場合は、例年より防除回数を1回増やすようにしましょう
- 薬剤防除の適期
斑点米カメムシ対策：1回目：出穂期7～10日後
2回目：1回目の7～10日後
イネカメムシ対策：1回目：出穂期頃
2回目：1回目の7～10日後

日	月	火	水	木	金	土
			7/1	2	3	4
					南部1回目	
5	6	7	8	9	10	11
南部1回目、北部1回目						
12	13	14	15	16	17	18
北部1回目						
19	20	21	22	23	24	25
南部2回目					南部出穂期	
26	27	28	29	30	31	8/1
北部2回目					北部出穂期	
2	3	4	5	6	7	8

図1 草刈り時期の目安

3 気象の経過（左：大田原アメダス、右：黒磯アメダス）



前回調査日（6/22）から、平均気温は北部、南部ともに平年並みで、前年より4℃/日程度低く推移した。また、降水量は北部で前年比77%とかなり少なく、南部で前年比163%と非常に多く推移した。

(参考) 今後の気象（関東甲信越地方1か月予報、7/2 気象庁発表）

気温、降水量、日照時間の各確率の確率 (%)			
気温	関東甲信越地方	向こう1か月 07/04～08/03	10 40 50
		1週目 07/04～07/10	20 50 30
		2週目 07/11～07/17	10 40 50
		3～4週目 07/18～07/31	10 40 50
降水量	関東甲信越地方	向こう1か月 07/04～08/03	40 40 20
日照時間	関東甲信越地方	向こう1か月 07/04～08/03	30 30 40

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

向こう1か月の気象予報

- 気温：高い確率50%
- 降水量：平年並みの確率、少ない確率40%
- 日照時間：多い確率40%



今後、出穂期が予測より早まる可能性があるため、**草刈りや、薬剤防除の準備を早めに行いましょう！**



7月～8月は「農作業中の熱中症による死亡事故」が集中します。
「自分だけは大丈夫」と思わないで、こまめな休息、水分補給を！