

水稻(6月下旬～7月上旬)

単位：％									備 考	
	葉いもち	紋枯病	縞葉枯病	心枯れ茎	イネドロオイムシ	イネツトムシ	ごま葉枯病	白葉枯病		
県全体発生ほ場率	10.5	2.6	28.9	7.9	18.4	1.3	0.0	0.0	令和6年6月下旬 総調査ほ場数：76	
平年値	8.0	1.9	26.5	6.8	22.1	14.0	－	－	※平年比＝(発生ほ場率／平年値) ×100	
平年比	131.5	136.8	109.4	116.0	83.3	9.4	－	－	※調査株数にカウントされるほど ではないが、ほ場内で発生が見ら れる場合は散見として発生ほ場数 にカウント	
発生程度	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	少	－	－	ごま葉枯病、白葉枯病はR5年度 以降調査のため平年値なし	
県全体発生株率	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：30	
平年値	0.1	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	－	－		
平年比	60.2	278.9	51.4	884.9	73.1	10.2	－	－		
発生程度	平年並	多	やや少	多	平年並	少	－	－		
県北部発生株率	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：26	
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	－	－		
平年比	400.0	－	5666.7	－	7.0	0.0	－	－		
発生程度	多	少	多	－	少	少	－	－		
県中部発生株率	0.0	0.4	0.2	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：20	
平年値	0.1	0.0	0.5	0.1	1.0	0.1	－	－		
平年比	0.0	912.6	32.9	901.3	84.1	0.0	－	－		
発生程度	少	多	やや少	多	平年並	少	－	－		
県南部発生株率	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
平年値	0.2	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	－	－		
平年比	62.5	0.0	32.4	－	0.0	37.0	－	－		
発生程度	平年並	少	やや少	少	(多)	やや少	－	－		
概 評	平年並	やや多	平年並	やや多	平年並	少	－	－		

葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病、ごま葉枯病、白葉枯病、心枯茎、イネドロオイムシ・イネツトムシは300株調査

水稻(7月中旬)

単位：％								備 考
	葉いもち	紋枯病	縞葉枯病	心枯れ茎	イネツトムシ	ごま葉枯病	白葉枯病	
県全体発生ほ場率	28.9	9.2	47.4	15.8	1.3	0.0	0.0	令和6年7月8～11日調査 総調査ほ場数：76 ※平年比＝（発生ほ場率／平年 値）×100 ※調査株数にカウントされるほ どではないが、ほ場内で発生が 見られる場合は散見として発生 ほ場数にカウント ごま葉枯病、白葉枯病はR5年度 以降調査のため平年値なし
平年値	28.1	12.9	40.5	10.8	6.3	－	－	
平年比	103.1	71.1	116.9	146.6	20.9	－	－	
発生程度	平年並	平年並	平年並	やや多	やや少	－	－	総調査ほ場数：30
県全体発生株率	0.6	1.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.4	0.7	0.9	0.1	0.0	－	－	
平年比	42.6	216.2	102.3	400.0	0.0	－	－	
発生程度	やや少	多	平年並	多	少	－	－	総調査ほ場数：26
県北部発生株率	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.1	0.2	0.1	0.1	0.0	－	－	
平年比	65.4	0.0	333.3	0.0	0.0	－	－	
発生程度	平年並	少	多	少	少	－	－	総調査ほ場数：20
県中部発生株率	0.3	1.7	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.2	0.5	1.0	0.2	0.0	－	－	
平年比	25.4	369.6	82.5	450.0	0.0	－	－	
発生程度	やや少	多	平年並	多	少	－	－	総調査ほ場数：20
県南部発生株率	0.9	3.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
平年値	1.4	1.4	2.6	0.0	0.0	－	－	
平年比	62.5	255.5	80.8	－	0.0	－	－	
発生程度	平年並	多	平年並	少	少	－	－	概 評
概 評	平年並	やや多	平年並	やや多	やや少	－	－	

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯茎・イネツトムシは300株調査

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(6月下旬)

		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		カスミカメ類			斑点米カメ ムシ類合計	
		幼虫	成虫	幼虫	成虫	アカヒゲ ホソミドリ リカスミ カメ幼虫 ・アカス ジカスミ カメ幼虫	イネホソ ミドリカ スミカメ 成虫	アカスジ カスミカ メ成虫		
発生地点数(か所)		0	2	7	17	31	33	30	38	総調査地点数：40 (20回振りすくい取り)
生 点 率	本 年 [A] (％)	0.0	5.0	17.5	42.5	77.5	82.5	75.0	95.0	
	平 年 [B] (％)	0.0	3.8	8.1	37.1	63.9	90.9	72.6	99.5	
	平年比 (％) (([A] / [B]) × 100)	－	133.2	216.3	114.4	121.4	90.7	103.3	95.5	
発生程度		少	平年並	多	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年値： 10か年の平均値 (平成26(2014)年～ 令和5(2023)年)
すくい取り頭数合計 (頭)		0	2	12	39	1958	620	698	3491	
頭 数	本年平均 [C] (頭)	0.0	0.1	0.3	1.0	49.0	15.5	17.5	87.3	
	平 年 [D] (頭)	0.0	0.0	0.2	0.8	27.2	19.7	11.3	64.6	
	平年比 (％) (([C] / [D]) × 100)	－	104.0	193.5	115.8	180.2	78.6	154.3	135.1	
発生程度		少	平年並	多	平年並	多	平年並	やや多	平年並	
概 評		平年並		平年並		やや多			平年並	

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(7月中旬)

		クモヘリカメムシ			ホソハリカメムシ			カスミカメ類				斑点米カメムシ類合計	
		幼虫	成虫	成幼虫	幼虫	成虫	成幼虫	アカヒゲ ホソミドリ カスミ カメ幼虫 ・アカス ジカスミ カメ幼虫	アカヒゲ ホソミドリ カスミ カメ成虫	アカスジ カスミカ メ成虫	カスミカ メ類合計		
発生地点数(か所)		0	12	12	12	26	28	26	24	25	32	33	総調査地点数: 33 (20回振りすくい取り)
発 生 地点率	本 年 [A] (%)	0.0	36.4	36.4	36.4	78.8	84.8	78.8	72.7	75.8	84.8	100.0	
	平 年 [B] (%)	1.1	36.7	36.7	24.6	67.3	71.4	87.9	89.3	87.3	97.3	99.7	
	([A] / [B]) × 100	0.0	99.2	99.2	147.5	117.0	118.9	89.6	81.5	86.8	87.2	100.3	
発生程度		少	平年並	平年並	やや多	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年値: 10か年の平均値 (2014~2023年)
すくい取り頭数合計(頭)		0	392	392	44	148	192	10973	1521	1794	14245	15293	
頭 数	本年平均 [C] (頭)	0.0	11.9	11.9	1.3	4.5	5.8	332.5	46.1	54.4	431.7	463.4	
	平 年 [D] (頭)	0.0	20.2	20.3	0.8	2.9	3.7	148.2	48.5	39.0	227.0	254.3	
	([C] / [D]) × 100	0.0	58.7	58.7	169.8	155.2	158.3	224.4	95.0	139.4	190.1	182.2	
発生程度		少	やや少	やや少	やや多	やや多	やや多	多	平年並	平年並	多	多	
概 評		平年並			平年並			やや多				やや多	

水田における斑点米カメムシ類すくい取り(7月上旬)

		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		アカヒゲホソミドリ カスミカメ		アカスジカスミカメ		斑点米カメ ムシ類成幼 虫	うちカスミ カメ類成幼 虫	備考
		幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫			
発生ほ場数(か所)		0	2	0	1	0	2	0	0	5	2	総調査ほ場数: 39ほ場 (20回振り すくい取り) 平年値はH26(2014)~ R5(2023)年の平均
発 生 ほ場率	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	0.0	5.1	0.0	2.6	0.0	5.1	0.0	0.0	12.8	5.1	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	0.0	5.6	0.0	0.3	0.3	5.6	0.3	0.5	12.1	6.4	
	([A] / [B]) × 100	-	91.1	-	866.7	0.0	91.1	0.0	0.0	105.8	79.7	
発生程度		少	平年並	少	多	少	平年並	少	少	平年並	平年並	
すくい取り頭数合計(頭)		0	4	0	1	0	3	0	0	8	3	
頭 数	本年平均値 [C] (頭)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	
	平年値 [D] (頭)	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	
	([C] / [D]) × 100	-	50.0	-	-	-	100.0	-	-	66.7	100.0	
発生程度		少	やや少	少	少	少	平年並	少	少	平年並	平年並	
概 評		平年並		平年並		平年並		少		平年並	平年並	

水田すくい取り(7月中旬)

		ウンカ類 幼虫	ヒメトビ ウンカ成 虫	セジロウ ンカ成虫	ヨコバイ 類幼虫	ツマグロ ヨコバイ 成虫	イナズマ ヨコバイ 成虫	イナゴ	イネミズ ゾウムシ	フタオビ コヤガ幼 虫	イチモン ジセセリ 幼虫	備考
発生ほ場数(か所)		17	35	2	1	7	1	25	7	0	0	総調査ほ場数: 39ほ場 (20回振り すくい取り) 平年値はH26(2014)~ R5(2023)年の平均
発 生 ほ場率	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	43.6	89.7	5.1	2.6	17.9	2.6	79.5	20.5	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	66.6	86.1	4.1	7.8	29.3	0.8	61.9	4.9	6.4	1.3	
	([A] / [B]) × 100	65.5	104.2	124.4	33.3	61.1	325.0	128.4	418.4	0.0	0.0	
発生程度		平年並	平年並	平年並	やや少	平年並	多	平年並	多	少	少	
すくい取り頭数合計(頭)		59	447	3	1	12	1	255	59	0	0	
頭 数	本年平均値 [C] (頭)	1.5	11.5	0.1	0.0	0.3	0.0	6.5	1.5	0.0	0.0	
	平年値 [D] (頭)	20.6	15.8	0.1	0.1	0.8	0.0	7.5	0.1	0.2	0.0	
	([C] / [D]) × 100	7.3	72.6	150.0	0.0	36.3	0.0	86.7	2166.7	0.0	0.0	
発生程度		少	平年並	やや多	少	やや少	少	平年並	多	少	少	
概 評		やや少	平年並	平年並	やや少	平年並	平年並	平年並	多	少	少	

いちご(育苗床・親株)

		灰褐色 病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	12	1	12	16	2	0	0	総調査ほ場数: 56か所 総調査株数: 1,400株 (調査株数 25株) ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比= (本年値/平年値) × 100
	本年値	3.6	0.0	21.4	1.8	21.4	28.6	3.6	0.0	0.0	
	平年値	1.4	0.0	32.1	0.2	13.6	29.9	12.2	0.4	0.0	
	平年比	257.1	-	66.7	900.0	157.4	95.7	29.5	0.0	-	
発生株率	発生株数	5	0	50	0	39	85	13	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.4	0.0	3.6	0.0	2.8	6.1	0.9	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	5.3	0.0	2.2	7.5	0.9	0.0	0.0	
	平年比	-	-	67.9	-	127.3	81.3	100.0	-	-	
発生程度		-	少	平年並	少	平年並	平年並	平年並	少	少	
概 評		多	少	平年並	平年並	やや多	平年並	やや少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がーとなっているものの概評を示す

トマト

単位：％																		
		灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび 病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ 類	コナ ジラ ミ類 (葉率)	アザ ミウ マ類 (花率)	ハモ グリ バエ 類幼 虫	タバ コガ 類お よび 被害	ハス モン トウ 幼虫	備考	
ほ場率	発生ほ場数	1	0	1	0	6	2	0	0	0	0	8	3	2	1	0	総調査ほ場数：11か所	
	本年値	9.1	0.0	9.1	0.0	54.5	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7	27.3	18.2	9.1	0.0	総調査株数：550株	
	平年値	1.9	1.8	14.4	20.1	52.6	4.8	0.0	—	—	—	3.6	36.4	4.6	14.0	7.7	0.0	(調査数：50株・100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉)
	平年比	478.9	0.0	63.2	0.0	103.6	379.2	—	—	—	—	0.0	199.7	593.5	130.0	118.2	—	夏秋トマト
葉率・ 株率	発生程度	多	少	平年並	少	平年並	多	少	少	少	少	多	多	平年並	平年並	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す	
	発生株数	1	0	5	0	109	1	0	0	0	0	163	24	2	1	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100	
	本年値	0.2	0.0	0.9	0.0	19.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	2.2	0.4	0.2	0.0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。	
	平年値	0.0	0.4	5.1	5.1	11.9	1.5	0.0	—	—	—	0.1	2.1	0.1	0.8	0.2	0.0	※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考値。
	平年比	—	0.0	17.6	0.0	166.4	13.3	—	—	—	—	0.0	704.8	2200.0	50.0	100.0	—	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	—	少	少	少	やや多	少	少	少	少	少	多	多	やや少	平年並	少		
概 評		(やや多)	少	やや少	少	平年並	平年並	少	少	少	少	多	多	平年並	平年並	少		

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がーとなっているものの概評を示す

なす

		単位：％														備考
		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすかび病(葉率)	アブラムシ類	ハダニ類(葉率)	アザミウマ類(葉率)	ハスモンヨトウ幼虫(葉率)	シロイチモジ幼虫(葉率)	ハモグリバエ類幼虫被害(葉率)	ハダニ類幼虫	コナジラミ類成幼虫(葉率)	
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0	0	3	0	4	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査数 50株、100葉、100果) ※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※シロイチモジ幼虫は2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	62.5	87.5	0.0	0.0	37.5	0.0	50.0	
	平年値	11.1	1.1	0.0	2.2	0.0	1.1	25.6	45.1	72.0	1.1	－	6.7	3.3	59.2	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	146.5	138.6	121.5	0.0	－	559.7	0.0	84.5	
株率・葉率	発生程度	少	少	少	少	少	少	やや多	平年並	平年並	少	少	多	少	平年並	
	発生株・葉数	0	0	0	0	0	0	11	45	68	0	0	4	0	15	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.6	8.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.9	
	平年値	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9	9.6	0.0	－	0.2	0.0	2.0	
概 評	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	220.5	143.2	88.6	0.0	－	312.5	0.0	93.1	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	多	やや多	平年並	少	少	多	少	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がーとなっているものの概評を示す

きゅうり

単位：％																	備考
		灰色か び病 (株率)	べと 病	うどんこ 病	褐斑 病	疫病 (株率)	モザイク 病 (株率)	黄化え そ病 (株率)	炭疽 病	斑点 細菌 病	アブラム シ類	アザミ ウマ類	ハモグリ バエ類 幼虫	コナジラ ミ類	ハダニ 類	ハスモン ヨトウ 幼虫 (株率)	
ほ場率	発生ほ場数	0	4	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	3	2	0	総調査ほ場数：6か所
	本年値	0.0	66.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	50.0	33.3	0.0	総調査葉数：600葉
	平年値	0.0	70.9	68.2	8.4	0.0	4.2	22.9	－	－	0.0	31.6	2.5	33.0	5.6	0.0	総調査株数：150株
	平年比	－	94.1	97.8	198.8	－	0.0	0.0	－	－	－	52.8	0.0	151.5	594.6	－	(調査葉数 100葉)
	発生程度	少	平年並	平年並	多	少	少	少	－	－	－	やや少	少	やや多	多	少	(調査株数 25株)
葉率・株 率	発生葉・株数	0	210	34	3	0	0	0	6	0	2	7	0	20	61	0	※平年比＝(本年値÷平年値)×100 [本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す] ※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はH5年度から調査。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	35.0	5.7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	1.2	0.0	3.3	10.2	0.0	
	平年値	0.0	19.2	13.6	1.8	0.0	0.1	3.9	－	－	0.0	4.7	0.0	1.7	0.7	0.0	
	平年比	－	182.3	41.9	27.8	－	0.0	0.0	－	－	－	25.5	－	194.1	1457.1	－	
	発生程度	少	多	やや少	やや少	少	少	少	－	－	－	やや少	少	多	多	少	
概 評		(少)	やや多	平年並	やや多	少	少	少	(やや多)	(少)	やや多	やや少	(少)	やや多	多	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がーとなっているものの概評を示す

ねぎ

		単位：％											備考
		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイチモジ幼虫	
ほ場率	発生ほ場数	5	1	6	0	0	0	6	0	0	0	0	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株) ※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジ幼虫はR2年度から調査
	本年平均値	62.5	12.5	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	50.5	11.4	77.3	0.0	0.0	1.3	69.8	2.7	0.0	1.3	0.0	
	平年比	123.8	109.6	97.0	－	－	0.0	107.4	0.0	－	0.0	－	
株率	発生程度	平年並	平年並	平年並	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
	発生株数	63	18	155	0	0	0	135	0	0	0	0	
	本年平均値	15.8	4.5	38.8	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	12.8	0.7	11.9	0.0	0.0	0.1	45.3	0.1	0.0	0.0	0.0	
概 評	平年比	123.4	642.9	326.1	－	－	0.0	74.6	0.0	－	－	－	
	発生程度	平年並	多	多	少	少	少	平年並	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がーとなっているものの概評を示す

なし

		黒星病	黒星病 (果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病 (果実)	ハダニ 類	ハマキム シ類被害 枝率	サビダニ 類被害枝 率	アブラム シ類寄生 枝率	シンク イムシ類 (果実)	カメモ シ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	3	0	8	0	6	0	5	6	0	0	総調査ほ場数: 28か所
	本年平均値	14.3	10.7	0.0	28.6	0.0	21.4	0.0	17.9	21.4	0.0	0.0	総調査葉数: 11,200葉
	平年値	18.0	11.7	0.7	12.5	0.0	5.5	1.5	49	24.0	0.4	0.7	(調査葉数 400葉)
	平年比	79.4	91.5	0.0	228.8	－	389.1	0.0	36.4	89.2	0.0	0.0	総調査枝・果実数: 2,700枝・果実
	発生程度	平年並	平年並	少	多	少	多	少	やや少	平年並	少	少	(調査枝・果実数 100枝・果実)
葉率・果 率・枝率	発生葉数	10	1	0	233	0	365	0	94	142	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での 幼虫調査 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内 で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウ ント
	本年平均値	0.1	0.0	0.0	2.1	0.0	3.3	0.0	3.4	5.1	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	16.5	3.7	0.0	0.0	
	平年比	100.0	0.0	－	2100.0	－	－	0.0	20.6	137.8	－	－	
概 評	発生程度	平年並	少	少	多	少	－	少	やや少	平年並	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内 で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウ ント
		平年並	やや少	少	多	(少)	(多)	少	やや少	平年並	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

ぶどう

		べと病 (葉)	晩腐病 (花穂)	黒とう病 (花穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数: 8か所
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数: 800葉・花穂
	平年値	3.1	1.3	8.2	1.0	0.0	0.0	1.3	(調査葉・花穂数: 100葉・花穂)
	平年比	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場 内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数に カウント
葉・花穂率	発生葉数	0	0	0	0	0	0	0	
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
	平年比	－	－	0.0	0.0	－	－	－	
概 評	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	
		少	少	少	(少)	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

りんご

		斑点落 葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病 (果実)	ハダ ニ類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンク イムシ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	7	0	5	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数: 7か所
	本年平均値	100.0	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉数: 2,800葉
	平年値	34.1	2.9	19.8	0.0	0.0	8.8	0.0	6.7	0.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	293.3	0.0	360.6	－	－	0.0	－	0.0	－	(調査果実数 100果)
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
葉率	発生葉数	59	0	30	0	0	0	0	0	0	※黒星病はH28年度から調査
	本年平均値	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ 場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場 数にカウント
	平年値	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
	平年比	525.0	－	1100.0	－	－	0.0	－	－	－	
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	
概 評		多	少	多	少	少	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

きく

		白さび病	アブラム シ類	ハダニ類	アザミウ マ類	ハモグリ バエ類	コナジラ ミ類	ハスモン ヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	5	6	1	0	1	0	総調査ほ場数: 10か所
	本年値	0.0	50.0	60.0	10.0	0.0	10.0	0.0	総調査株数: 500株
	平年値	10.7	8.2	53.0	18.2	0.0	1.1	1.0	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	609.8	113.2	54.9	－	909.1	0.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	発生程度	少	多	平年並	やや少	少	多	少	
株率	発生株数	0	10	85	9	0	9	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	2.0	17.0	1.8	0.0	1.8	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が 見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	1.7	1.0	13.2	3.2	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	200.0	128.8	56.3	－	－	－	
	発生程度	少	多	平年並	やや少	少	－	少	
概 評		少	多	平年並	やや少	(少)	(やや多)	少	※シロイチモジヨトウの発生はなかった。

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す