

水稻(6月下旬～7月上旬)

単位：％

	葉いもち	紋枯病	縞葉枯病	心枯れ茎	イネドロオイムシ	イネツトムシ	備 考
県全体発生ほ場率	4.9	0.0	21.3	8.2	11.5	4.9	令和7年6月23日～25日 総調査ほ場数：61 ※ 平年比＝(発生ほ場率／平年値)×100 ※ 調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント 葉いもち発病ほ場における発病度は全て0ランク ごま葉枯病、白葉枯病は発生なし
平年値	8.9	1.9	25.4	6.2	22.2	13.1	
平年比	55.1	0.0	84.0	132.5	51.8	37.5	
発生程度	やや少	少	平年並	平年並	やや少	やや少	
県全体発生株率	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	総調査ほ場数：26
平年値	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	
平年比	30.0	0.0	51.5	118.1	22.9	25.2	
発生程度	やや少	少	やや少	平年並	やや少	やや少	
県北部発生株率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：21
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
平年比	0.0	－	157.3	－	0.0	82.4	
発生程度	少	少	やや多	－	少	平年並	
県中部発生株率	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	総調査ほ場数：14
平年値	0.1	0.1	0.3	0.2	1.0	0.1	
平年比	0.0	0.0	51.1	95.9	26.8	25.6	
発生程度	少	少	やや少	平年並	やや少	やや少	
県南部発生株率	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	総調査ほ場数：14
平年値	0.2	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	
平年比	43.3	0.0	46.6	－	0.0	0.0	
発生程度	やや少	少	やや少	やや多	少	少	
概 評	やや少	少	平年並	平年並	やや少	やや少	

葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病、ごま葉枯病、白葉枯病、心枯茎、イネドロオイムシ・イネツトムシは300株調査

水稻(7月中旬)

単位：％

	葉いもち	紋枯病	縞葉枯病	心枯れ茎	イネツトムシ	備 考
県全体発生ほ場率	15.9	9.5	39.7	28.6	0.0	令和7年7月7～9日調査 総調査ほ場数：63 ※ 平年比＝(発生ほ場率／平年値)×100 ※ 調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント 葉いもち、紋枯病発病ほ場における発病度は全て0ランク ごま葉枯病、白葉枯病は発生なし
平年値	29.4	12.6	40.0	10.8	5.3	
平年比	53.9	75.7	99.2	264.3	0.0	
発生程度	やや少	平年並	平年並	多	少	
県全体発生株率	0.8	0.2	0.9	0.3	0.0	総調査ほ場数：26
平年値	1.4	0.9	0.8	0.1	0.0	
平年比	55.6	23.0	112.5	272.7	0.0	
発生程度	やや少	やや少	平年並	多	少	
県北部発生株率	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	総調査ほ場数：21
平年値	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	
平年比	28.6	－	33.3	－	－	
発生程度	やや少	－	やや少	－	－	
県中部発生株率	1.8	0.5	1.8	0.4	0.0	総調査ほ場数：16
平年値	0.3	1.7	0.8	0.9	0.0	
平年比	600.0	29.4	225.0	44.4	－	
発生程度	多	やや少	多	やや少	－	
県南部発生株率	0.4	0.2	0.9	0.4	0.0	総調査ほ場数：16
平年値	0.9	3.5	2.1	0.2	0.0	
平年比	44.4	5.7	42.9	200.0	－	
発生程度	やや少	少	やや少	多	－	
概 評	やや少	平年並	平年並	多	少	

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯茎・イネツトムシは300株調査

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(6月中旬)

		イネカメムシ			クモヘリカメムシ			ホソハリカメムシ			ミナミアオカメムシ			カスミカメ類				斑点米カメムシ類合計	
		幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	イネホソミドリカスミカメ・アカスジカスミカメ幼虫	アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫	アカスジカスミカメ成虫	合計		
発生地点数(か所)		0	1	1	0	2	2	6	22	23	0	2	2	29	31	33	35	40	総調査地点数：42 (20回振りすくい取り)
発 生 地点率	本年[A](%)	0.0	2.4	2.4	0.0	4.8	4.8	14.3	52.4	54.8	0.0	4.8	4.8	69.0	73.8	78.6	83.3	95.2	
	平 年[B](%)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.4	37.4	40.5	0.0	0.0	0.0	55.5	89.2	71.6	97.7	99.0	
	([A]／[B])×100	－	－	－	－	124.1	133.0	151.6	139.9	135.2	－	－	－	124.4	82.8	109.7	85.3	96.2	
	発生程度	少	－	－	少	平年並	平年並	やや多	平年並	平年並	少	－	－	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	
頭 数	すくい取り頭数合計(頭)	0	1	1	0	2	2	13	179	187	0	2	2	663	226	686	1556	1781	10か年の平均値 (2015～2024年) ※ イネカメムシとミナミアオカメムシは2024年から調査
	本年平均[C](頭)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.3	4.5	0.0	0.0	0.0	15.8	5.4	16.3	37.0	42.4	
	平 年[D](頭)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	13.7	19.1	10.2	62.7	64.9	
	([C]／[D])×100	－	－	－	－	97.4	102.8	173.1	494.3	427.7	－	－	－	114.9	28.2	159.6	59.1	65.4	
	発生程度	少	－	－	少	平年並	平年並	やや多	多	多	少	－	－	平年並	やや少	やや多	やや少	平年並	
概 評		－			平年並			多			－			平年並				平年並	

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(7月中旬)

		イネカメムシ			クモヘリカメムシ			ホソハリカメムシ			ミナミアオカメムシ			カスミカメ類				斑点米カメムシ類合計	
		幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	イネホソミドリカスミカメ・アカスジカスミカメ幼虫	アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫	アカスジカスミカメ成虫	合計		
発生地点数(か所)		0	1	1	0	2	2	6	22	23	0	2	2	29	31	33	35	40	総調査地点数: 42
発生地点率	本年[A](%)	0.0	2.4	2.4	0.0	4.8	4.8	14.3	52.4	54.8	0.0	4.8	4.8	69.0	73.8	78.6	83.3	95.2	(20回振りすくい取り)
	平年[B](%)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.4	37.4	40.5	0.0	0.0	0.0	55.5	89.2	71.6	97.7	99.0	
	([A]÷[B])×100	-	-	-	-	124.1	133.0	151.6	139.9	135.2	-	-	-	124.4	82.8	109.7	85.3	96.2	
	発生程度	少	-	-	少	平年並	平年並	やや多	平年並	平年並	少	-	-	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	平年値:
頭数	すくい取り頭数合計(頭)	0	1	1	0	2	2	13	179	187	0	2	2	663	226	686	1556	1781	10か年の平均値
	本年平均[C](頭)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.3	4.5	0.0	0.0	0.0	15.8	5.4	16.3	37.0	42.4	(2015～2024年)
	平年[D](頭)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	13.7	19.1	10.2	62.7	64.9	※ イネカメムシとミナミアオカメムシは2024年から調査
	([C]÷[D])×100	-	-	-	-	97.4	102.8	173.1	494.3	427.7	-	-	-	114.9	28.2	159.6	59.1	65.4	
発生程度		少	-	-	少	平年並	平年並	やや多	多	多	少	-	-	平年並	やや少	やや多	やや少	平年並	
概 評		-			平年並			多			-			平年並				平年並	

水田における斑点米カメムシ類すくい取り(7月上旬)

		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		イネカメムシ		ミナミアオカメムシ		カスミカメムシ類			斑点米カメムシ類成虫	備考
		幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	イネホソミドリカスミカメ成虫	アカスジカスミカメ成虫	イネホソミドリ・アカスジ幼虫		
発生ほ場数(か所)		0	3	0	1	0	3	0	0	0	3	1	9	総調査ほ場数: 32ほ場
発生ほ場率	発生ほ場率[A](%)	0.0	9.4	0.0	3.1	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	9.4	3.1	28.1	(20回振り
	発生ほ場率平年値[B](%)	0.0	6.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.5	0.0	13.3	すくい取り)
	([A]÷[B])×100	-	151.6	-	620.0	-	-	-	-	0.0	1880.0	-	211.3	平年値はH27(2015)～
	発生程度	少	やや多	少	多	少	(多)	少	少	少	多	(やや多)	多	R6(2024)年の平均
頭数	すくい取り頭数合計(頭)	0	5	0	1	0	11	0	0	0	4	1	22	
	本年平均値[C](頭)	0.0	0.2	0.0	0.03	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.03	0.7	
	平年値[D](頭)	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	
	([C]÷[D])×100	-	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	233.3	
発生程度		少	平年並	少	平年並	少	(多)	少	少	少	(多)	(やや多)	多	
概 評		やや多		やや多		(多)		(少)		やや多			多	

水田すくい取り(7月中旬)

		ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ成虫	セジロウンカ成虫	ヨコバイ類幼虫	ツマグロヨコバイ成虫	イナズマヨコバイ成虫	イナゴ	イネミズゾウムシ	フタオビコヤガ幼虫	イチモンジセセリ幼虫	備考
発生ほ場数(か所)		21	28	0	0	6	1	10	0	0	0	総調査ほ場数: 32ほ場
発生ほ場率	発生ほ場率[A](%)	65.6	87.5	0.0	0.0	18.8	3.1	31.3	0.0	0.0	0.0	(20回振り
	発生ほ場率平年値[B](%)	64.1	86.9	4.6	4.9	27.7	1.0	64.4	6.9	6.2	1.3	すくい取り)
	([A]÷[B])×100	102.3	100.7	0.0	0.0	67.9	310.0	48.6	0.0	0.0	0.0	平年値はH27(2015)～
	発生程度	平年並	平年並	少	少	平年並	多	やや少	少	少	少	R6(2024)年の平均
頭数	すくい取り頭数合計(頭)	146	551	0	0	8	1	45	0	0	0	
	本年平均値[C](頭)	4.6	17.2	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	
	平年値[D](頭)	8.9	13.3	0.1	0.1	0.7	0.0	6.8	0.2	0.2	0.0	
	([C]÷[D])×100	51.6	129.5	0.0	0.0	40.1	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0	
発生程度		やや少	平年並	少	少	やや少	少	やや少	少	少	少	
概 評		平年並	平年並	少	少	平年並	平年並	やや少	少	少	少	

いちご(育苗床・親株)

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	6	0	7	17	2	1	0	総調査ほ場数: 54か所 総調査株数: 1,325株
	本年値	1.9	0.0	11.1	0.0	13.0	31.5	3.7	1.9	0.0	(調査株数 25株)
	平年値	1.2	0.0	29.9	0.4	14.4	27.9	11.2	0.4	0.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	平年比	158.3	-	37.1	0.0	90.3	112.9	33.0	475.0	-	※平年比＝(本年値÷平年値)×100
発生株率	発生程度	やや多	少	やや少	少	平年並	平年並	やや少	多	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	0	0	15	0	29	75	1	5	0	
	本年値	0.0	0.0	1.1	0.0	2.2	5.7	0.1	0.4	0.0	
	平年値	0.0	0.0	4.8	0.0	2.4	6.3	0.9	0.0	0.0	
概 評	平年比	-	-	22.9	-	91.7	90.5	11.1	-	-	
	発生程度	少	少	やや少	少	平年並	平年並	少	-	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	青枯病	萎凋病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉率)	アザミウマ類(花率)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫・被害	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	1	5	4	0	1	0	0	8	1	1	0	0	総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 （調査数：50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉） 夏秋トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※本年比＝（本年値／平年値）×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	9.1	9.1	45.5	36.4	0.0	9.1	0.0	0.0	72.7	9.1	9.1	0.0	0.0	
	平年値	2.8	1.8	11.6	15.1	53.0	6.6	0.0	9.1	0.0	3.6	44.0	9.6	10.8	6.1	0.0	
	平年比	0.0	0.0	78.4	60.3	85.8	551.5	－	100.0	－	0.0	165.2	94.8	84.3	0.0	－	
	発生程度	少	少	平年並	平年並	平年並	多	少	平年並	少	少	やや多	平年並	平年並	少	少	
葉率・株率	発生株数	0	0	45	1	82	71	0	0	0	0	230	1	18	0	0	
	本年値	0.0	0.0	8.2	0.2	14.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.1	3.3	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.4	1.5	2.4	12.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	0.8	0.4	0.2	0.0	
	平年比	－	0.0	546.7	8.3	116.4	860.0	－	－	－	0.0	653.1	12.5	825.0	0.0	－	
	発生程度	少	少	多	少	平年並	多	少	少	少	少	多	少	多	少	少	
概 評		少	少	やや多	やや少	平年並	多	少	やや少	少	少	やや多	やや少	やや多	少	(少)	

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度（本年値と平年値の比較）が－となっているものの概評を示す

なす

		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半葉萎凋病	輪紋病	すすかび病(葉率)	アブラムシ類	ハダニ類(葉率)	アザミウマ類(葉率)	ハスモンヨトウ幼虫(葉率)	シロイチモジヨトウ幼虫(葉率)	タバコガ類幼虫被害(果率)	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類成幼虫(葉率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	3	0	1	総調査ほ場数：9か所 総調査株数：450株 （調査数 50株、100葉、100果） ※本年比＝（平均値／平年値）×100 ※シロイチモジヨトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	77.8	0.0	0.0	33.3	0.0	11.1	
	平年値	10.0	1.1	0.0	2.2	0.0	1.1	24.9	46.9	70.7	1.1	－	8.2	2.2	56.4	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	142.2	110.0	0.0	－	406.1	0.0	19.7	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	やや多	平年並	少	少	多	少	少	
株率・葉率	発生株・葉数	0	0	0	0	0	0	0	31	33	0	0	2	0	2	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
	平年値	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.3	7.4	0.0	－	0.1	0.0	2.0	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	102.1	50.2	0.0	－	250.0	0.0	9.8	
	発生程度	少	少	少	少	(少)	少	少	やや多	平年並	少	少	多	少	少	
概 評		少	少	少	少	(少)	少	少	やや多	平年並	少	少	多	少	少	

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度（本年値と平年値の比較）が－となっているものの概評を示す

ねぎ

		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所 総調査株数：350株 （調査株数 50株） ※本年比＝（平均値／平年値）×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
	本年平均値	0.0	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	56.8	12.7	77.7	0.0	0.0	1.3	67.3	2.7	0.0	1.3	0.0	
	平年比	0.0	112.6	73.5	－	－	0.0	106.1	0.0	－	0.0	－	
	発生程度	少	平年並	平年並	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
株率	発生株数	0	2	31	0	0	0	170	0	0	0	0	
	本年平均値	0.0	0.6	8.9	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	14.4	1.2	15.3	0.0	0.0	0.1	41.6	0.1	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	50.0	58.2	－	－	0.0	116.8	0.0	－	－	－	
	発生程度	少	やや少	やや少	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
概 評		少	平年並	平年並	少	少	少	平年並	少	少	少	(少)	

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度（本年値と平年値の比較）が－となっているものの概評を示す

なし

単位：％

		黒星病	黒星病 (果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病 (果実)	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 被害枝 率	サビダ ニ類被 害枝率	アブラ ムシ類 寄生枝 率	シンク イムシ 類 (果実)	カメモ シ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	2	0	7	0	5	0	0	3	0	0	総調査ほ場数：26か所
	本年値	15.4	7.7	0.0	26.9	0.0	19.2	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	総調査葉数：10,400葉
	平年値	16.2	11.0	0.7	13.9	0.0	6.6	1.5	46	24.7	0.4	0.7	(調査葉数 400葉)
	平年比	95.1	70.0	0.0	193.5	－	290.9	0.0	0.0	46.6	0.0	0.0	総調査枝・果実数：2,600枝・果実
	発生程度	平年並	平年並	少	多	少	多	少	少	やや少	少	少	(調査枝・果実数 100枝・果実)
葉率・果 率・枝率	発生葉数	8	1	0	38	0	14	0	0	70	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値
	平年値	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.4	0.1	15.2	4.1	0.0	0.0	※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始
	平年比	100.0	0.0	－	133.3	－	25.0	0.0	0.0	65.9	－	－	
	発生程度	平年並	少	少	平年並	少	やや少	少	少	平年並	少	少	※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
概 評		平年並	やや少	少	やや多	(少)	やや多	少	(少)	やや少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

単位：％

		べと病 (葉)	晩腐病 (花穂)	黒とう病 (花穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数：900葉・花穂
	平年値	3.1	0.0	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	(調査葉・花穂数：100葉・花穂)
	平年比	0.0	－	0.0	0.0	－	－	－	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
葉・花穂率	発生葉数	0	0	0	0	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	－	－	0.0	0.0	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		少	(少)	少	(少)	(少)	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：％

		斑点落 葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病 (果実)	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンクイ ムシ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	6	0	4	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所
	本年平均値	85.7	0.0	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉数：2,800葉
	平年値	42.4	2.9	26.9	0.0	0.0	7.2	0.0	6.7	0.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	202.1	0.0	212.3	－	－	0.0	－	0.0	－	(調査果実数 100果)
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
葉率	発生葉数	39	0	97	0	0	0	0	0	0	※黒星病はH28年度から調査
	本年平均値	1.4	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
	平年比	233.3	－	1750.0	－	－	0.0	－	－	－	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	
概 評		多	少	多	(少)	(少)	少	(少)	少	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

さく

単位：％

		白さび 病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	1	3	1	0	0	0	総調査ほ場数：10か所
	本年値	10.0	10.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：500株
	平年値	10.7	13.2	52.7	15.6	0.0	2.1	1.0	(調査株数 50株)
	平年比	93.5	75.8	56.9	64.1	－	0.0	0.0	
	発生程度	平年並	平年並	やや少	平年並	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
株率	発生株数	2	10	68	2	0	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.4	2.0	13.6	0.4	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.7	1.2	13.9	2.2	0.0	0.2	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	23.5	166.7	97.8	18.2	－	0.0	－	
	発生程度	やや少	やや多	平年並	少	少	少	少	
概 評		平年並	平年並	やや少	やや少	(少)	(少)	少	※シロイチモジトウの発生はなかった。

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す