

水稻(8月下旬～9月中旬)

	穂 い も ち					稲こうじ病	白穂※	紋枯病	縞葉枯病	ごま葉枯病	白葉枯病	備考
	穂 首	枝 梗			発病穂率							
		重	中	軽								
県全体発生ほ場率	0.0	1.6	4.7	9.4	14.1	6.3	6.3	56.3	32.8	34.4	12.5	・総調査ほ場数:64 ・穂いもち及び白穂は25株、稲こうじ病、紋枯病、ごま葉枯病及び白葉枯病は50株、縞葉枯病は300株調査 ・発病率は、稲こうじ病、紋枯病、縞葉枯病、ごま葉枯病及び白葉枯病は発病株率、穂いもち及び白穂は発病穂率 ・調査日:8月下旬～9月中旬 ・平年比＝(発生ほ場率／平年値)×100 ・調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ・ごま葉枯病、白葉枯病は2023年8月から調査開始
平年値	26.4	8.2	14.1	27.3	41.1	26.3	9.9	62.2	43.8	20.8	0.9	
平年比	0.0	19.0	33.2	34.3	34.2	23.8	63.2	90.4	74.9	165.2	1387.5	
発生程度	少	少	やや少	やや少	やや少	やや少	平年並	平年並	平年並	やや多	多	
県全体発病率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.0	0.8	1.1	0.3	
平年値	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	0.0	12.2	1.5	0.7	0.0	
平年比	0.0	11.0	21.4	10.2	9.0	11.5	330.0	106.3	56.4	162.2	－	
発生程度	少	少	やや少	少	少	少	多	平年並	やや少	やや多	多	
概 評	やや少					やや少	やや多	平年並	平年並	(やや多)	(多)	
(地域別調査結果)												
単位：％												
	穂 い も ち					稲こうじ病	白穂※	紋枯病	縞葉枯病	ごま葉枯病	白葉枯病	備考
	穂 首	枝 梗			発病穂率							
		重	中	軽								
県北部発病率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.3	13.8	1.2	調査ほ場数: 26
平年値	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	1.2	0.0	7.4	0.6	6.3	0.0	
平年比	0.0	0.0	28.8	17.3	12.8	0.0	100.5	97.6	58.0	218.6	－	
発生程度	少	少	やや少	少	少	少	平年並	平年並	やや少	多	多	
県中部発病率	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.4	0.06	16.1	1.5	1.7	0.1	調査ほ場数: 22
平年値	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.8	5.6	6.5	1.8	3.5	0.0	
平年比	0.0	24.1	9.5	0.0	7.7	45.0	1.1	248.5	80.8	49.8	－	
発生程度	少	やや少	少	少	少	やや少	少	多	平年並	やや少	多	
県南部発病率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	18.1	0.9	2.0	4.6	調査ほ場数:16
平年値	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	15.1	3.7	1.4	0.0	
平年比	0.0	0.0	0.0	11.4	6.6	0.0	1053.6	120.0	23.3	142.9	－	
発生程度	少	少	平年並	やや少	少	少	多	平年並	やや少	やや多	多	

大豆病虫害発生状況調査結果(9月上旬)

		べと病	カメムシ類 成・幼虫 (頭数)	その他チヨ ウ目幼虫 (頭数)	フタスジヒ メハムシ (頭数)	アブラムシ 類 (株数)	シロイチモ ジヨトウ (頭数)	コガネムシ 類 (株数)	備考
発生ほ場数(か所)		29	8	8	3	10	0	0	総調査ほ場数: 30か所 総調査株数: 750株 (調査株数: 1ほ場25株) 平年値はH28(2016)～R7(2025)年の平均
ほ場率 (%)	本年平均値	96.7	26.7	26.7	10.0	33.3	0.0	0.0	
	平年値	89.5	35.4	36.4	22.0	50.8	1.0	1.3	
	平年比	108.0	75.4	73.4	45.5	65.6	0.0	0.0	
	発生程度	平年並	平年並	平年並	やや少	平年並	少	少	
頭数又は株数合計(頭、株)		588	13	28	3	115	0	0	※ $\text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
頭数 株率 (%)	本年平均値	78.4	0.4	0.9	0.1	3.8	0.0	0.0	
	平年値	64.8	0.5	1.4	1.1	4.4	0.0	0.0	
	平年比	121.0	86.0	64.3	9.1	86.4	－	－	
	発生程度	平年並	平年並	平年並	少	平年並	少	少	
概 評		平年並	平年並	平年並	やや少	平年並	少	少	

※) ハスモンヨトウは卵塊、幼虫のいる白変葉、幼虫の有無を調査

大豆ハスモンヨトウ調査結果(9月上旬)

		ハスモン ヨトウ (発生の有 無)	ハスモン ヨトウ白 変葉(株 数)	ハスモン ヨトウ卵 塊数	ハスモン ヨトウ若 齢幼虫コ ロニー数	ハスモン ヨトウ中 老齢幼虫 数	備考
発生ほ場数(か所)		8	4	4	4	5	総調査ほ場数: 30 総調査株数: 750株 (調査株数: 1ほ場25株) 平年値はH28(2016)～R7(2025)年の平均
発 生 ほ場率	発生ほ場率 [A] (%)	26.7	13.3	13.3	13.3	16.7	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	34.8	13.1	2.7	8.7	23.1	
	([A] / [B]) × 100	76.7	101.5	492.6	152.9	72.3	
	発生程度	平年並	平年並	多	やや多	平年並	
葉数又は頭数合計(葉、頭)		－	1	1	1	14	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
発 生 程 度	葉数又は頭数平均値 [C] (葉、頭)	－	0.03	0.03	0.03	0.47	
	葉数又は頭数平年値 [D] (葉、頭)	－	0.16	0.02	0.07	1.20	
	([C] / [D]) × 100	－	18.8	150.0	42.9	39.2	
	発生程度	やや少	少	やや多	やや少	やや少	
概 評		平年並	－	－	－	－	

いちご(育苗・本ほ)

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	2	0	4	0	8	15	1	1	1	総調査ほ場数：57か所 総調査株数：1,425株 (調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	3.5	0.0	7.0	0.0	14.0	26.3	1.8	1.8	1.8	
	平年値	8.2	0.0	2.6	0.4	4.7	8.9	0.6	1.8	0.0	
	平年比	42.7	－	269.2	0.0	297.9	295.5	300.0	100.0	－	
発 生 株 率	発生程度	やや少	少	多	少	多	多	多	平年並	－	
	発生株数	2	0	9	0	24	114	6	0	0	
	本年値	0.1	0.0	0.6	0.0	1.7	8.0	0.4	0.0	0.0	
	平年値	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	1.4	0.0	0.1	0.0	
概 評	平年比	50.0	－	600.0	－	425.0	571.4	－	0.0	－	
	発生程度	やや少	少	多	少	多	多	－	少	少	
	概 評	やや少	(少)	多	少	多	多	(やや多)	やや少	(多)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすかび病(葉率)	アブラムシ類	ハダニ類(葉率)	アザミヨトウ幼虫(葉率)	シロイチモジ幼虫(葉率)	ハダニ幼虫被害(果率)	アザミ幼虫(葉率)	コナジラミ類成虫(葉率)	備考	
ほ場率	発生ほ場数	4	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	2	2	4	総調査ほ場数：8か所
	本年値	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	37.5	0.0	0.0	25.0	25.0	50.0	総調査株数：400株
	平年値	44.7	0.0	9.0	3.7	2.2	15.0	12.7	32.0	36.2	12.8	0.0	12.0	8.8	63.5	(調査数 50株、100葉、100果)
	平年比	111.9	－	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4	78.1	103.6	0.0	－	208.3	284.1	78.7	※平年比＝(平均値／平年値)×100
株率・葉率	発生程度	平年並	少	少	少	少	少	平年並	平年並	平年並	少	少	多	多	平年並	※シロイチモジトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害果率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	発生株・葉数	76	0	0	0	0	0	5	5	7	0	0	5	3	54	
	本年値	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.9	0.0	0.0	0.6	0.8	6.8	
	平年値	12.4	0.0	0.4	0.2	0.1	1.4	0.6	3.6	3.0	0.2	0.0	0.1	0.8	5.2	
	平年比	153.7	－	0.0	0.0	0.0	0.0	236.4	16.6	30.3	0.0	－	500.0	103.9	130.3	
概 評	発生程度	やや多	少	少	少	少	少	多	少	やや少	少	少	多	平年並	平年並	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	(平年並)	(少)	少	少	(少)	少	やや多	やや少	平年並	少	(少)	多	やや多	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

		灰色か び病 (株率)	べと 病	うどん こ病	褐斑 病	疫病 (株率)	びり 病 (株率)	黄化え そ病 (株率)	炭疽 病	斑点 細菌 病	アブラ ムシ 類	アザミ マ類	ハモン ヨトウ 幼虫	コナジ ラミ 類	ハダニ 類	ハモン ヨトウ 幼虫 (株率)	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	6	1	0	総調査ほ場数：7か所 総調査葉数：700葉 総調査株数：175株 ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※灰色かび病はH26年度から、ハモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	本年値	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	85.7	14.3	0.0	
	平年値	0.0	23.2	43.7	10.7	0.0	1.9	13.7	4.8	0.0	1.7	10.5	1.4	58.3	3.5	0.0	
	平年比	－	61.6	0.0	133.6	－	0.0	0.0	297.9	－	841.2	0.0	0.0	147.0	408.6	－	
葉 率 ・ 株 率	発生程度	少	平年並	少	平年並	少	少	少	多	少	多	少	少	やや多	多	少	
	発生葉・株数	0	6	0	6	0	0	0	2	0	2	0	0	66	2	0	
	本年値	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	9.4	0.3	0.0	
	平年値	0.0	3.0	4.4	0.7	0.0	0.0	1.7	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	9.5	0.1	0.0	
概 評	平年比	－	30.0	0.0	128.6	－	－	0.0	225.6	－	－	0.0	－	98.9	300.0	－	
	発生程度	少	やや少	少	平年並	少	少	少	多	少	－	少	少	平年並	多	少	
	概 評	(少)	平年並	少	平年並	(少)	(少)	少	やや多	(少)	(やや多)	少	(少)	やや多	やや多	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

		さび病	べと病	黒斑症 状	軟腐病	萎縮病	アブラ ムシ類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類幼虫	ハスモ ンヨト ウ幼虫	ネギコ ガ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	0	0	8	0	0	0	8	1	0	0	0	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株) ※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
	本年値	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	12.5	0.0	0.0	0.0	
	平年値	14.3	1.3	96.3	0.0	0.0	0.0	63.6	2.5	0.0	1.3	12.5	
	平年比	0.0	0.0	103.8	－	－	－	157.2	500.0	－	0.0	0.0	
株 率	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	やや多	多	少	少	少	
	発生株数	0	0	182	0	0	0	390	1	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	97.5	0.3	0.0	0.0	0.0	
	平年値	2.2	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	37.7	0.6	0.0	0.0	0.6	
概 評	平年比	0.0	－	163.7	－	－	－	258.6	50.0	－	－	0.0	
	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	多	やや少	少	少	少	
	概 評	少	(少)	平年並	(少)	(少)	(少)	やや多	やや多	(少)	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：％

		斑点落葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病 (果実)	ハダニ類	ハマキムシ類 幼虫	アブラムシ類	シンクイムシ類 (果実)	カメムシ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：5か所 総調査葉数：2,000葉 (調査葉数 400葉) (調査果実数 100果) ※ $\text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$
	本年平均値	80.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	61.5	0.0	81.8	0.0	15.7	36.9	1.3	9.5	0.0	28.6	
	平年比	130.1	-	122.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
	発生程度	平年並	少	平年並	少	少	少	少	少	少	少	
葉率	発生葉数	42	0	94	0	0	0	0	0	0	0	※黒星病はH28年度から調査 ※カメムシ類はR6年度から調査 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	2.1	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.2	0.0	3.2	0.0	0.2	3.8	0.0	0.1	0.0	0.1	
	平年比	175.0	-	146.9	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	
	発生程度	やや多	少	やや多	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		平年並	(少)	平年並	(少)	少	少	少	少	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	6	0	2	0	総調査ほ場数：10か所 総調査株数：500株 (調査株数 50株) ※ $\text{本年値} = \text{本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す}$ ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$
	本年値	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	
	平年値	3.1	11.3	63.5	8.2	4.1	0.0	
	平年比	0.0	177.0	94.5	0.0	487.8	-	
	発生程度	少	やや多	平年並	少	多	少	
株率	発生株数	0	2	61	0	13	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.4	12.2	0.0	2.6	0.0	
	平年値	0.8	1.7	14.7	0.2	0.1	0.0	
	平年比	0.0	23.5	83.0	0.0	2600.0	-	
	発生程度	少	やや少	平年並	少	多	少	
概 評		少	平年並	平年並	少	(多)	(少)	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す