

BLASTAMによる葉いもち感染好適条件判定結果（令和7年度）

●：感染好適条件 ○^{1~4}：準感染好適条件 —：感染好適条件なし

●感染好適条件：湿潤時間中の平均気温が15～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20～25℃の範囲にある

○準感染好適条件：好適条件に準ずる気象条件

準感染好適条件1：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20℃未満

準感染好適条件2：湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25℃以上

準感染好適条件3：湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外

準感染好適条件4：湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い

※上記条件であっても、3mを越える風や時間雨量3mmを越える雨があると湿潤時間の継続が打ち切りとなり、感染好適条件でなくなる場合がある

感染好適条件が出現した日から7～10日後に発病する可能性がありますので、ほ場をよく観察し、いもち病の発生状況に応じて、適期に防除を行いましょう。

日付	那須	黒磯	大田原	塩谷	真岡	宇都宮	今市	鹿沼	小山	佐野
6/01	—	—	—	—	—	—	○3	—	—	—
6/02	—	—	—	—	—	—	—	○4	○4	—
6/03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○1
6/04	○3	○4	○4	○4	—	—	○3	—	—	—
6/05	—	—	—	○4	—	—	○3	○4	—	—
6/06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/10	—	—	—	—	●	○4	—	—	●	●
6/11	○1	●	●	●	●	●	○1	●	●	●
6/12	—	—	○4	●	—	—	—	●	—	—
6/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/14	○4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/16	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
6/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/18	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
6/19	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
6/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/24	○4	—	○2	○2	—	—	—	—	—	—
6/25	—	—	—	—	○2	○2	—	○2	—	—