

水稲 定点の再生稲による黄萎病、縞葉枯病の発生状況

単位: %

調査場所	黄萎病	縞葉枯病	備考(調査月日)
県全体発生ほ場率	0.0	67.9	調査ほ場数: 56 調査日: 9月24日～10月8日 300株調査 ※平年値はH27～R6年の10カ年平均 ※平年比=(発生株率/平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、 ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生 ほ場数にカウント ※巡回調査時に耕起後または再生稲未生長の 定点は定点の周辺ほ場で調査
平年値	1.2	68.2	
平年比	-	99.4	
発生程度	少	平年並	
県全体発病株率	0.0	8.0	
平年値	0.1	5.0	
平年比	0.0	157.8	
発生程度	少	やや多	
概 評	少	平年並	

イネカメムシ再生稲・畦畔等すくい取り調査結果

		イネカメムシ合計			備考
			幼虫	成虫	
発 生 ほ場率 (%)	発生ほ場数(か所)	10	1	10	・ 総調査ほ場数:64ほ場 ・ 20回振りすくい取り ・ R6(2024)年から調査開始
	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	15.6	1.6	15.6	
	発生ほ場率前年値 [B] (%)	16.9	0.0	16.9	
	([A] ／ [B]) × 1 0 0	92.3	－	92.2	
	発生程度	前年並	－	前年並	
発 生 頭 数 (頭)	すくい取り頭数合計 (頭)	23	7	16	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.36	0.11	0.25	
	すくい取り頭数前年値 [D] (頭)	11.18	0.00	11.20	
	([C] ／ [D]) × 1 0 0	3.2	－	2.2	
	発生程度	少	－	少	
概 評		やや少	(多)	やや少	

○地域別巡回調査結果

		イネカメムシ合計			備考
			幼虫	成虫	
県北生ほ場率(%)	発生ほ場数(か所)	2	0	2	・調査ほ場数:26ほ場
	発生ほ場率 [A] (%)	7.7	0.0	7.7	
	発生ほ場率前年値 [B] (%)	0.0	0.0	0.0	
	([A] / [B]) × 100	-	-	-	
	発生程度	多	少	-	
県北生頭数(頭)	すくい取り頭数合計 (頭)	2	0	2	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.08	0.00	0.08	
	すくい取り頭数前年値 [D] (頭)	0.00	0.00	0.00	
	([C] / [D]) × 100	-	-	-	
	発生程度	多	少	-	
県中生ほ場率(%)	発生ほ場数(か所)	2	1	2	・調査ほ場数:22ほ場
	発生ほ場率 [A] (%)	9.1	4.5	9.1	
	発生ほ場率前年値 [B] (%)	4.3	0.0	4.3	
	([A] / [B]) × 100	211.4	-	211.4	
	発生程度	多	-	多	
県中生頭数(頭)	すくい取り頭数合計 (頭)	14	7	7	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.64	0.32	0.32	
	すくい取り頭数前年値 [D] (頭)	0.04	0.00	0.04	
	([C] / [D]) × 100	35000.0	-	17500.0	
	発生程度	多	-	多	
県南生ほ場率(%)	発生ほ場数(か所)	6	0	6	・調査ほ場数:16ほ場
	発生ほ場率 [A] (%)	37.5	0.0	37.5	
	発生ほ場率前年値 [B] (%)	50.0	0.0	50.0	
	([A] / [B]) × 100	75.0	-	75.0	
	発生程度	前年並	少	前年並	
県南生頭数(頭)	すくい取り頭数合計 (頭)	7	0	7	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.44	0.00	0.44	
	すくい取り頭数前年値 [D] (頭)	36.30	0.00	36.30	
	([C] / [D]) × 100	1.2	-	1.2	
	発生程度	少	少	少	

いちご(本ぽ)

単位: %

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	7	0	0	2	1	7	1	21	0	総調査ほ場数: 63か所 総調査株数: 1,575株 (調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の 平均値を示す
	本年値	11.1	0.0	0.0	3.2	1.6	11.1	1.6	33.3	0.0	
	平年値	11.0	0.0	2.0	1.6	6.0	15.2	9.5	10.7	0.5	
	平年比	100.9	－	0.0	200.0	26.7	73.0	16.8	311.2	0.0	
発生株率	発生株数	9	0	0	0	1	86	1	23	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5	0.1	1.5	0.0	
	平年値	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	3.2	0.4	0.6	0.0	
	平年比	200.0	－	0.0	－	20.0	171.9	25.0	250.0	－	
発生程度	発生程度	多	少	少	少	やや少	やや多	やや少	多	少	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5	0.1	1.5	0.0	
	平年値	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	3.2	0.4	0.6	0.0	
	平年比	200.0	－	0.0	－	20.0	171.9	25.0	250.0	－	
概 評		やや多	少	少	平年並	やや少	平年並	少	多	少	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
		やや多	少	少	平年並	やや少	平年並	少	多	少	
		やや多	少	少	平年並	やや少	平年並	少	多	少	
		やや多	少	少	平年並	やや少	平年並	少	多	少	

トマト

単位: %

		灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび 病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ類	コナ ジラミ 類(葉 率)	アザ ミウ マ類(花 率)	ハモ グリ バエ 類幼虫	タバ コガ 類幼虫・ 被害	ハス モン ヨト ウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	6	0	1	0	0	総調査ほ場数: 17か所 総調査株数: 850株 (調査数: 50株、100株・果、葉かび・すすかび150 葉、その他100葉) 促成長期どり栽培、促成栽培 ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値 を示す
	本年値	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	17.6	0.0	5.9	0.0	0.0	35.3	0.0	5.9	0.0	0.0	
	平年値	0.0	3.3	3.6	11.7	2.3	10.4	0.0	5.9	0.0	0.0	28.4	0.0	3.0	1.9	0.9	
	平年比	－	0.0	0.0	150.4	0.0	169.2	－	100.0	－	－	124.3	－	196.7	0.0	0.0	
発生株率	発生株数	0	0	0	17	0	2	0	0	0	0	16	0	2	0	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前 は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.2	0.0	2.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.1	0.0	
	平年比	－	0.0	－	83.3	0.0	100.0	－	－	－	－	52.9	－	200.0	0.0	－	
発生程度	発生程度	少	少	少	やや多	少	やや多	少	少	少	少	平年並	少	多	少	少	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
	本年値	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.2	0.0	2.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.1	0.0	
	平年比	－	0.0	－	83.3	0.0	100.0	－	－	－	－	52.9	－	200.0	0.0	－	
概 評		少	少	少	やや多	少	やや多	少	やや少	少	少	平年並	少	(やや多)	少	(少)	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
		少	少	少	やや多	少	やや多	少	やや少	少	少	平年並	少	(やや多)	少	(少)	
		少	少	少	やや多	少	やや多	少	やや少	少	少	平年並	少	(やや多)	少	(少)	
		少	少	少	やや多	少	やや多	少	やや少	少	少	平年並	少	(やや多)	少	(少)	

きゅうり

単位: %

		灰色か び病 (株率)	べと 病	うどん こ病	褐斑 病	疫病 (株率)	モザイク 病 (株率)	黄化え そ病 (株率)	炭疽 病	斑点 細菌 病	アブラ ムシ類	アザ ミウ マ類	ハモ グリ バエ 類幼虫	コナ ジラミ 類	ハダ ニ類	ハスモ ンヨ トウ 幼虫 (株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	1	1	8	2	3	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉数: 900葉 総調査株数: 225株 ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※本年値は本年の地点ごとの調査結果の 平均値を示す
	本年値	0.0	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	22.2	11.1	11.1	88.9	22.2	33.3	
	平年値	0.0	56.1	46.8	22.7	0.0	3.0	19.9	0.0	0.0	3.0	19.2	9.7	61.9	0.0	5.1	
	平年比	－	39.6	0.0	97.8	－	0.0	111.6	－	－	740.0	57.8	114.4	143.6	－	652.9	
発生株率	発生株数	0	3	0	26	0	0	45	0	0	2	8	1	223	3	2	※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨ トウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク 病、黄化えそ病はH29年度から株率調 査。それ以前の平年値は参考値。炭 疽病、斑点細菌病はR5年度から調 査。
	本年値	0.0	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.1	24.8	0.3	0.9	
	平年値	0.0	10.4	7.9	1.8	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	15.9	0.0	0.1	
	平年比	－	2.9	0.0	161.1	－	－	512.8	－	－	200.0	90.0	16.7	156.0	－	900.0	
発生程度	発生程度	少	少	少	やや多	少	少	多	－	－	多	平年並	少	やや多	－	多	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
	本年値	0.0	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.1	24.8	0.3	0.9	
	平年値	0.0	10.4	7.9	1.8	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	15.9	0.0	0.1	
	平年比	－	2.9	0.0	161.1	－	－	512.8	－	－	200.0	90.0	16.7	156.0	－	900.0	
概 評		少	やや少	少	平年並	少	少	やや多	(少)	(少)	多	やや少	やや少	やや多	(やや多)	多	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
		少	やや少	少	平年並	少	少	やや多	(少)	(少)	多	やや少	やや少	やや多	(やや多)	多	
		少	やや少	少	平年並	少	少	やや多	(少)	(少)	多	やや少	やや少	やや多	(やや多)	多	
		少	やや少	少	平年並	少	少	やや多	(少)	(少)	多	やや少	やや少	やや多	(やや多)	多	

ねぎ

単位: %

		さび病	べと病	黒斑症 状	軟腐病	萎縮病	アブラ ムシ類	アザミ ウマ類	ハモグ リバエ 類幼虫	ハスモ ンヨト ウ幼虫	ネギコ ガ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	5	0	0	0	8	2	1	0	4	総調査ほ場数: 8か所 総調査株数: 400株 (調査株数 50株) ※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	12.5	0.0	50.0	
	平年値	15.2	0.0	95.0	2.7	0.0	1.3	48.2	27.9	7.5	1.3	22.5	
	平年比	0.0	－	65.8	0.0	－	0.0	207.5	89.6	166.7	0.0	222.2	
発生株率	発生株数	0	0	45	0	0	0	267	5	1	0	46	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場 内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数に カウント
	本年値	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	66.8	1.3	0.3	0.0	11.5	
	平年値	0.5	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	10.1	2.6	0.2	0.1	2.5	
	平年比	0.0	－	66.9	－	－	－	661.4	50.0	150.0	0.0	460.0	
発生程度	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	多	やや少	やや多	少	多	※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
	本年値	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	66.8	1.3	0.3	0.0	11.5	
	平年値	0.5	0.0	16.9	0.0	0.0	0.0	10.1	2.6	0.2	0.1	2.5	
	平年比	0.0	－	66.9	－	－	－	661.4	50.0	150.0	0.0	460.0	
概 評		少	少	平年並	少	少	少	多	平年並	やや多	少	多	注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す
		少	少	平年並	少	少	少	多	平年並	やや多	少	多	
		少	少	平年並	少	少	少	多	平年並	やや多	少	多	
		少	少	平年並	少	少	少	多	平年並	やや多	少	多	

にら

単位: %

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	0	0	2	総調査ほ場数: 11か所 総調査株数: 550株 (調査株数 50株) ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※株率の平年値は過去10年の値 ※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	18.2	
	平年値	4.3	0.0	5.1	0.0	7.0	7.2	
	平年比	0.0	-	178.4	-	0.0	252.8	
	発生程度	少	少	やや多	少	少	多	
株率	発生株数	0	0	1	0	0	4	
	本年値	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	
	平年値	0.1	0.0	0.9	0.0	0.4	0.7	
	平年比	0.0	-	22.2	-	0.0	100.0	
	発生程度	少	少	やや少	少	少	平年並	
概 評		少	少	平年並	少	少	やや多	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位: %

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	2	0	0	2	4	総調査ほ場数: 10か所 総調査株数: 500株 (調査株数 50株) ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。
	本年値	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	40.0	
	平年値	3.3	12.2	71.2	9.6	0.0	5.0	5.1	
	平年比	0.0	0.0	28.1	0.0	-	400.0	784.3	
	発生程度	少	少	やや少	少	少	多	多	
株率	発生株数	0	0	15	0	0	3	2	
	本年値	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.6	0.4	
	平年値	0.6	1.3	19.7	0.5	0.0	0.2	0.1	
	平年比	0.0	0.0	15.2	0.0	-	300.0	400.0	
	発生程度	少	少	少	少	少	多	多	
概 評		少	少	やや少	少	(少)	(多)	多	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す