

水稻(7月下旬)

単位：％

	葉いもち	葉いもち 上位3葉	紋枯病	縞葉枯病	心枯茎※	ごま葉枯病	白葉枯病	イネツトムシ	備 考
県全体発生ほ場率(A)(%)	17.5	15.9	19.0	33.3	12.7	12.7	0.0	4.8	令和7(2025)年7月28日～8月6日調査 総調査ほ場数：63 ※ $\text{平年比} = (\text{発生ほ場率} \div \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ○葉いもち(上位3葉)の発生量は平年並 ○葉いもちの発生程度は一部除きD(面積0.5%) ○紋枯病の発生程度はD(第3葉鞘以下) ○白葉枯病は確認されず
平年値(B)(%)	38.1	17.4	39.0	49.0	7.7	1.3	-	3.8	
$(A) \div (B) \times 100$	45.9	91.0	48.9	68.1	165.1	990.5	-	123.8	
発生程度	やや少	平年並	やや少	平年並	やや多	多	-	平年並	
県全体発生株率(A)(%)	1.4	1.4	2.1	1.1	0.1	0.2	0.0	0.1	
平年値(B)(%)	2.9	1.1	3.7	1.4	0.0	0.1	-	0.1	総調査ほ場数：26
$(A) \div (B) \times 100$	49.0	129.7	57.5	78.6	315.4	193.6	-	70.3	
発生程度	やや少	平年並	やや少	平年並	多	多	-	平年並	
県北部発生株率(A)(%)	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	
平年値(B)(%)	2.9	0.9	1.7	0.3	0.1	-	-	0.1	
$(A) \div (B) \times 100$	5.3	13.1	6.9	66.4	512.8	-	-	0.0	総調査ほ場数：21
発生程度	少	少	少	平年並	多	-	-	少	
県中部発生株率(A)(%)	4.0	4.0	2.7	1.9	0.1	0.2	0.0	0.2	
平年値(B)(%)	1.0	0.3	2.7	1.7	0.1	-	-	0.0	
$(A) \div (B) \times 100$	413.6	1596.2	101.2	112.0	145.8	-	-	963.0	
発生程度	多	多	平年並	平年並	やや多	-	-	やや多	総調査ほ場数：16
県南部発生株率(A)(%)	0.1	0.1	4.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
平年値(B)(%)	5.8	2.6	8.3	2.6	0.0	-	-	0.2	
$(A) \div (B) \times 100$	2.2	4.8	55.6	56.5	0.0	-	-	0.0	
発生程度	少	少	やや少	やや少	少	-	-	少	
概 評	やや少	平年並	やや少	平年並	やや多	多	-	平年並	

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯茎・イネツトムシは300株調査
※ 心枯茎：ニカメイガの被害によるものを調査した

水田におけるすくい取り(8月上旬)

		クモヘリ カメムシ		ホソハリ カメムシ		イネカメムシ		ミナミアオ カメムシ		イネホソミドリ カスミカメ		アカスジ カスミカメ		重点米 カメムシ 類成幼虫	うちカス ミカメ類 成幼虫	備考
発 生 ほ場率	発生ほ場数(か所)	6	8	0	3	1	1	0	0	0	1	0	10	19	10	総調査ほ場数：63ほ場 (20回振り すくい取り) ※イネカメムシ、ミ ナミアオカメムシの平 年値はR3(2021)～ R6(2024)年の平均
	発 生 ほ 場 率 [A](%)	9.5	12.7	0.0	4.8	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	15.9	30.2	15.9	
	発生ほ場率平年値[B](%)	4.8	9.8	0.0	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	14.4	0.9	13.4	31.8	21.8	
	$([A] \div [B]) \times 100$	197.9	129.6	-	111.6	533.3	-	-	-	0.0	11.1	0.0	118.7	95.0	72.9	
	発生程度	多	平年並	少	平年並	多	-	少	少	少	少	平年並	平年並	平年並	平年並	
頭 数	すくい取り頭数合計(頭)	27	28	0	4	2	1	0	0	0	2	0	40	104	42	
	すくい取り頭数平均値[C](頭)	0.4	0.4	0.0	0.1	0.03	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	0.7	
	すくい取り頭数平年値[D](頭)	0.3	0.4	0.0	0.1	0.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.6	0.8	
	$([C] \div [D]) \times 100$	133.3	100.0	-	100.0	300.0	-	-	-	-	0.0	-	150.0	106.3	87.5	
	発生程度	平年並	平年並	少	平年並	多	-	少	少	少	少	少	やや多	平年並	平年並	
概 評		やや多		平年並		多		少		少		平年並		平年並	平年並	

		ウンカ 類幼虫	ヒメト ビウン カ成虫	セジロ ウンカ 成虫	ヨコバ イ類幼 虫	ツマグ ロヨコ バイ成 虫	イナズ マヨコ バイ成 虫	イナゴ	イネミ ズゾウ ムシ	フタオ ビコヤ ガ幼虫	イチモ ンセリ 幼虫	備考
発 生 ほ場率	発生ほ場数(か所)	61	61	0	15	35	1	21	7	1	0	総調査ほ場数：63ほ場 (20回振り すくい取り) ※イネカメムシ、ミ ナミアオカメムシの平 年値はH27(2015)～ R6(2024)年の平均
	発 生 ほ 場 率 [A](%)	96.8	96.8	0.0	23.8	55.6	1.6	33.3	11.1	1.6	0.0	
	発生ほ場率平年値[B](%)	94.0	97.1	23.4	40.3	60.6	1.8	57.0	24.1	3.0	5.3	
	$([A] \div [B]) \times 100$	103.0	99.7	0.0	59.1	91.7	88.9	58.4	46.1	53.3	0.0	
	発生程度	平年並	平年並	少	やや少	平年並	平年並	やや少	やや少	やや少	少	
頭 数	すくい取り頭数合計(頭)	9,154	1611	0	82	255	1	51	14	1	0	
	すくい取り頭数平均値[C](頭)	145.3	25.6	0.0	1.3	4.0	0.02	0.8	0.2	0.0	0.0	
	すくい取り頭数平年値[D](頭)	314.6	39.5	0.5	20.4	20.5	0.04	2.9	0.8	0.1	0.1	
	$([C] \div [D]) \times 100$	46.2	64.8	0.0	6.4	19.5	50.0	27.6	25.0	0.0	0.0	
	発生程度	やや少	平年並	少	少	少	やや少	やや少	やや少	少	少	
概 評		平年並	平年並	少	やや少	やや少	平年並	やや少	やや少	やや少	少	

大豆

		べと病	カメムシ類 成虫(頭 数)	カメムシ類 幼虫(頭 数)	その他テ ウ目幼虫 (頭数)	フタスジ ヒメハムシ (頭数)	アブラムシ 類(株数)	シロイチモ ジヨトウ (頭数)	コガネムシ 類(株数)	備考
ほ場率 (%)	発生ほ場数(か所)	14	4	1	19	4	2	1	1	総調査ほ場数：27か所 総調査株数：675株 (調査株数：1ほ場25株) ※ $\text{平年比} = (\text{本年平均値} \div \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場 内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数に カウント
	本年平均値	51.9	14.8	3.7	70.4	14.8	7.4	3.7	3.7	
	平年値	67.2	18.0	2.2	66.5	11.1	32.7	0.4	4.0	
	平年比	77.2	82.2	168.2	105.9	133.3	22.6	925.0	92.5	
	発生程度	平年並	平年並	やや多	平年並	平年並	やや少	多	平年並	
頭数 株率 (%)	頭数又は株数合計(頭、株)	221	4	1	90	10	2	1	0	
	本年平均値	8.2	0.1	0.3	3.3	0.4	0.1	0.2	0.0	
	平年値	8.9	0.3	0.0	2.0	0.3	0.9	0.0	0.1	
	平年比	92.1	33.3	-	165.0	133.3	11.1	-	0.0	
概 評		平年並	やや少	-	やや多	平年並	少	-	少	

※) ハスモンヨトウは卵塊、幼虫のいる白変葉、幼虫の有無を調査

		ハスモン ヨトウ白 変葉（株 数）	ハスモン ヨトウ卵 塊数	ハスモン ヨトウ若 齢幼虫コ ロニー数	ハスモン ヨトウ中 老齢幼虫 数	ハスモン ヨトウ （発生の有 無）	備考
発生ほ場数（か所）		4	0	0	9	10	総調査ほ場数：27
発 生 ほ場率	発 生 ほ 場 率 [A]（％）	14.8	0.0	0.0	33.3	37.0	総調査株数：675株
	発生ほ場率平年値 [B]（％）	5.3	0.7	3.4	16.2	19.0	（調査株数：1ほ場25株）
	（ [A] ÷ [B] ） × 100	279.2	0.0	0.0	205.6	194.7	平年値はH27(2015)～R6(2024)年の平均
	発生程度	多	少	少	多	多	
葉数又は頭数合計（葉、頭）		13	0	0	24	－	
発 生 程 度	葉数又は頭数平均値 [C]（葉、頭）	0.5	0.0	0.0	0.9	－	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	葉数又は頭数平年値 [D]（葉、頭）	0.1	0.0	0.0	0.5	－	
	（ [C] ÷ [D] ） × 100	500.0	－	－	180.0	－	
	発生程度	多	少	少	やや多	やや多	
概 評		－	－	－	－	多	

いちご(育苗)

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	3	0	3	3	7	15	1	2	0	総調査ほ場数：57か所 総調査株数：1,400株
	本年値	5.3	0.0	5.3	5.3	12.3	26.3	1.8	3.5	0.0	(調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	平年値	5.7	0.0	3.0	0.2	14.9	21.1	1.7	1.4	0.0	
	平年比	93.0	－	176.7	2650.0	82.6	124.6	105.9	250.0	－	
	発生程度	平年並	少	やや多	多	平年並	平年並	平年並	多	少	
発 生 株 率	発生株数	1	0	3	8	51	57	0	3	0	※平年比＝(本年値÷平年値)×100
	本年値	0.1	0.0	0.2	0.6	3.6	4.1	0.0	0.2	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.1	0.0	0.1	0.0	2.3	4.0	0.1	0.0	0.0	
	平年比	100.0	－	200.0	－	156.5	102.5	0.0	－	－	
	発生程度	平年並	少	多	－	やや多	平年並	少	－	少	
概 評		平年並	少	やや多	多	平年並	平年並	やや少	多	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

		灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび病	うどん こ病	黄化 葉巻病	モザ イク病	青枯 病	萎凋 病	アブ ラムシ類	コナジ ラミ類 (葉率)	アザミ ウマ類 (花率)	ハモグ リバエ 類幼虫	タバコ ガ類幼 虫・被 害	ハスモ ンヨト ウ幼虫	備考
ほ場 率	発生ほ場数	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	6	0	4	1	0	総調査ほ場数：6か所
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	16.7	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0	0.0	66.7	16.7	0.0	総調査株数：300株
	平年値	3.6	0.0	17.3	40.7	38.7	10.8	0.0	33.3	0.0	1.4	61.6	0.0	12.1	17.2	0.0	(調査数：50株・100花・果・葉かび・すすかび150葉、その他100葉)
	平年比	0.0	－	0.0	0.0	172.4	154.6	－	100.0	－	0.0	162.3	－	551.2	97.1	－	夏秋トマト
	発生程度	少	少	少	少	やや多	やや多	少	平年並	少	少	やや多	少	多	平年並	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
葉率・ 株率	発生株数	0	0	0	0	60	3	0	16	0	0	219	0	59	1	0	※平年比＝(本年値÷平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	1.0	0.0	5.3	0.0	0.0	36.5	0.0	19.7	0.3	0.0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	平年値	0.7	0.0	7.4	14.6	10.6	2.1	0.0	5.3	0.0	0.4	10.2	0.0	0.3	0.5	0.0	
	平年比	0.0	－	0.0	0.0	188.7	47.6	－	100.0	－	0.0	357.8	－	6566.7	60.0	－	
	発生程度	少	少	少	少	多	やや少	少	平年並	少	少	多	少	多	平年並	少	
概 評		少	少	少	少	やや多	平年並	少	平年並	少	少	やや多	少	多	平年並	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

		うどん こ病	灰色か び病 (葉率)	青枯 病	半身 萎凋 病	輪紋 病	すすか び病 (葉率)	アブラムシ 類	ハダニ類 (葉率)	アザミウ マ類 (葉率)	ハスモン ヨトウ 幼虫 (葉率)	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫 (葉率)	ハダニ類 被害 (葉率)	ハモグ リバエ 類幼虫	コナジ ラミ 類成虫 (葉率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	0	0	0	4	2	7	0	0	2	0	3	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	44.4	22.2	77.8	0.0	0.0	22.2	0.0	33.3	総調査株数：450株
	平年値	24.0	0.0	6.9	3.3	0.0	4.9	28.6	36.7	57.4	3.5	－	9.4	3.6	66.4	(調査数 50株、100葉、100果)
	平年比	0.0	－	160.9	0.0	－	0.0	155.2	60.5	135.5	0.0	－	236.2	0.0	50.2	※平年比＝(平均値÷平年値)×100
	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	やや多	平年並	平年並	少	少	多	少	やや少	
株率・ 葉率	発生株・葉数	0	0	0	0	0	0	9	10	30	0	0	3	0	8	※シロイチモジヨトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降実率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害果率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	
	平年値	2.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.5	2.8	3.5	6.9	0.0	－	0.2	0.1	4.8	
	平年比	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	72.5	31.3	48.2	0.0	－	150.0	0.0	18.8	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	平年並	やや少	やや少	少	少	やや多	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評		少	少	(平年並)	少	(少)	少	やや多	平年並	平年並	少	少	多	少	やや少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

		単位：％											備考
		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	
ほ場率	発生ほ場数	0	0	7	0	0	0	7	1	0	0	4	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株)
	本年値	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	87.5	12.5	0.0	0.0	50.0	
	平年値	15.7	1.3	96.1	0.0	0.0	0.0	63.4	1.3	0.0	1.3	5.0	
	平年比	0.0	0.0	91.1	－	－	－	138.0	961.5	－	0.0	1000.0	
株率	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	平年並	多	少	少	多	※平年比＝（平均値／平年値）×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
	発生株数	0	0	91	0	0	0	267	23	0	0	13	
	本年値	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	0.0	66.8	5.8	0.0	0.0	3.3	
	平年値	2.2	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0	0.0	0.1	
概 評	平年比	0.0	－	79.4	－	－	－	173.5	－	－	－	3300.0	
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	やや多	－	少	少	多	
概 評		少	少	平年並	少	少	少	平年並	(やや多)	少	少	多	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

		単位：％											備考
		黒星病	黒星病(果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病(果実)	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	サビダニ類被害枝率	アブラムシ類寄生枝率	シンクイムシ類(果実)	カメムシ類(果実)	
ほ場率	発生ほ場数	2	0	0	4	0	14	0	0	3	0	0	総調査ほ場数：26か所 総調査葉数：10,400葉 (調査葉数 400葉) 総調査枝・果実数：2,600枝・果実 (調査枝・果実数 100枝・果実)
	本年値	7.7	0.0	0.0	15.4	0.0	53.8	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	
	平年値	12.5	15.8	0.0	8.1	0.0	25.1	2.6	52	6.3	0.4	2.6	
	平年比	61.6	0.0	－	190.1	－	214.3	0.0	0.0	182.5	0.0	0.0	
葉率・果率・枝率	発生程度	平年並	少	少	多	少	多	少	少	多	少	少	※平年比＝（平均値／平年値）×100 ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値 ※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
	発生葉数	10	0	0	32	0	518	0	0	9	0	0	
	本年値	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	5.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	1.4	0.1	18.6	0.1	0.0	0.0	
概 評	平年比	100.0	0.0	－	300.0	－	357.1	0.0	0.0	300.0	－	－	
	発生程度	平年並	少	少	多	少	多	少	少	多	少	少	
概 評		平年並	少	(少)	多	(少)	多	少	少	多	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

		べと病 (葉)	晩腐病 (花穂)	黒とう 病(花穂)	灰色か び病 (葉)	ハマキムシ類 (花穂)	アザミウ マ類(花穂)	アブラム シ類(葉)	ハダニ 類(葉)	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数：900葉・花穂
	平年値	25.6	10.4	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	(調査葉・花穂数：100葉・花穂)
	平年比	43.4	0.0	0.0	－	－	0.0	－	－	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
	発生程度	やや少	少	少	少	少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
葉・花穂率	発生葉数	1	0	0	0	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	6.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		やや少	少	少	(少)	(少)	少	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：％

		斑点落葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病(果実)	ハダニ類	ハマキムシ類幼虫	アブラムシ類	シンクイムシ類(果実)	カメムシ類(果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	5	0	5	0	0	0	1	0	0	3	総調査ほ場数：7か所
	本年平均値	71.4	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	42.9	総調査葉数：2,800葉
	平年値	52.9	0.0	55.7	0.0	2.9	9.1	2.9	14.8	0.0	57.1	(調査葉数 400葉)
	平年比	135.0	－	128.2	－	0.0	0.0	493.1	0.0	－	75.1	(調査果実数 100果)
	発生程度	平年並	少	多	少	少	少	多	少	少	平年並	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
葉率	発生葉数	79	0	61	0	0	0	1	0	0	2	※黒星病はH28年度から調査
	本年平均値	2.8	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	※カメムシ類はR6年度から調査
	平年値	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	0.0	0.2	
	平年比	350.0	－	200.0	－	－	0.0	0.0	0.0	－	50.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	やや少	
概 評		やや多	(少)	多	(少)	少	少	平年並	少	(少)	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	5	2	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	11.1	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	総調査株数：450株
	平年値	6.4	10.3	63.0	8.4	0.0	3.2	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	107.8	88.3	264.3	－	0.0	－	
	発生程度	少	平年並	平年並	多	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
株率	発生株数	0	2	84	4	0	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.4	18.7	0.9	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.3	1.2	19.5	0.7	0.0	0.1	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	0.0	33.3	95.9	128.6	－	0.0	－	
	発生程度	少	やや少	平年並	平年並	少	少	少	
概 評		少	平年並	平年並	やや多	(少)	(少)	(少)	※シロイチモジヨトウの発生はなかった。

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す